

Prevenção também contagia



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed

Vacinas	CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO																					Disponibilização de Vacinas							
	Idade																					Gratuitos nas UBS*	Clínicas privadas						
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	Adolescente 11 a 19 anos	Adulto 20 a 60 anos			Idoso mais de 60 anos					
BCG ID	1ª dose Vacinar os não vacinados anteriormente															Vacinar pacientes em situações especiais e de risco						SIM	SIM						
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente														SIM	SIM						
Rotavírus	Duas a três doses: iniciar a vacinação antes de 15 semanas de vida			CONTRAINDICADA																		SIM	SIM						
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou na impossibilidade de dTpa, fazer dT)							SIM (DTPw, dT e dTpa para gestantes)		SIM (DTPa e dTpa)					
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pacientes em situações especiais de risco							SIM (para as 3 primeiras doses)		SIM					
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		REFORÇO		Vacinar pacientes em situações especiais de risco							SIM (para as 3 primeiras doses)		SIM					
Pneumocócica conjugada	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar em situações especiais de risco					VPC13: 1 dose		SIM (VPC10 para menores de 5 anos)		SIM					
Meningocócicas conjugada	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO		REFORÇO		REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados 2 doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pacientes em situações especiais de risco					SIM (MenC para menores de 5 anos e de 11 a 14 anos)		SIM					
Meningocócica B	Três doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO		Para os não vacinados anteriormente: De 12 a 23 meses e 29 dias: 3 doses. De 24 meses a 19 anos: 2 doses					Vacinar pacientes em situações especiais de risco					NÃO		SIM				
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	Campanhas nacionais de vacinação																					SIM		NÃO					
Infuenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																					SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos		SIM					
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal																					SIM		SIM					
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pacientes em situações especiais de risco				SIM (até 49 anos)		SIM					
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente											SIM		SIM					
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente											Vacinar pacientes em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos		SIM			
HPV																Duas doses da vacina para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: 2 doses. De 15 anos em diante: 3 doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente a critério médico				SIM, duas doses Meninas (9 a 14 anos) Meninos (11 a 14 anos)		SIM			
Pneumocócica 23 valente																Vacinar pacientes em situações especiais de risco							Duas doses com intervalo de 5 anos				NÃO		SIM
Herpes Zóster																					De 50 a 59 anos a critério médico		Uma dose				NÃO		SIM
Dengue	CONTRAINDICADA															Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 - 6 - 12 meses					CONTRAINDICADA		NÃO		SIM				

* Verifique quais são as vacinas disponibilizadas na rede pública de saúde e se você se enquadra nos critérios para a vacinação. ■ Rotina ■ Vacinar não vacinados ■ Situações especiais ■ Contraindicada
Fonte: SBIM Calendário 2019-2020.