



Verifique quais as vacinas disponibilizadas na rede pública de saúde e se você se enquadra nos critérios para a vacinação.

Vacinas	Esquemas	Disponibilização de Vacinas	
		Postos públicos de vacinação	Clínicas privadas de imunização
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses da vacina acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. Para adolescentes com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de surto de caxumba e risco para a doença.	SIM (SCR)	SIM (SCR e SCRv)
Hepatites A e B	Hepatite A: duas doses – esquema 0-6 meses.	NÃO	SIM
	Hepatite B: três doses – esquema 0-1-6 meses.	SIM	
	Hepatite A e B: para menores de 16 anos: em duas doses – esquema 0-6 meses. Para maiores de 16 anos: em três doses – esquema 0-1-6. A vacinação combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B.	NÃO	
HPV	Se o esquema de vacinação não foi iniciado aos 9 anos, aplicar a vacina o mais precocemente possível. • O esquema de vacinação para meninas e meninos menores de 15 anos é de duas doses com intervalo de seis meses (0 - 6 meses). • Para adolescentes com idade ≥ 15 anos, não imunizados anteriormente, o esquema é de três doses (0 - 1 a 2 - 6 meses).	SIM, HPV4 – duas doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos	SIM, HPV4 e HPV2
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	Com esquema de vacinação completo, incluindo a dose dos 9-10 anos: dose de reforço, preferencialmente com dTpa, dez anos após a última.	SIM (dT para todos. dTpa para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto)	SIM (dTpa e dTpa-VIP)
	Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.		
	Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses.		
Varicela (catapora)	Para suscetíveis: duas doses. Para menores de 13 anos: intervalo de três meses. A partir de 13 anos: intervalo de um a dois meses.	NÃO	SIM (varicela e SCRv)
Influenza (gripe)	Dose única anual.	SIM (para grupos específicos)	SIM
Meningocócicas conjugadas ACWY/C	Para não vacinados na infância: duas doses com intervalo de cinco anos. Para vacinados na infância: reforço aos 11 anos ou cinco anos após o último reforço na infância.	SIM, menC (11 a 14 anos)	SIM
Meningocócica B	Duas doses com intervalo de um a dois meses.	NÃO	SIM
Febre amarela	Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada, em especial para aqueles vacinados antes dos 2 anos de idade, pela maior possibilidade de falha vacinal primária.	SIM	SIM
Dengue	Recomendada para adolescentes soropositivos. Esquema de três doses com intervalo de seis meses (0 - 6 - 12 meses). Licenciada para pessoas entre 9 e 45 anos.	NÃO	SIM

Ative suas defesas. Mantenha seu cartão de vacinas sempre atualizado.