



Vacinas	Esquemas	Disponibilização de Vacinas	
		Postos públicos de vacinação	Clínicas privadas de imunização
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses da vacina acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. Para adultos com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de surto de caxumba e risco para a doença.	SIM (2 doses até 29 anos; 1 dose entre 30 e 49 anos)	SIM
Hepatites A e B	Hepatite A: duas doses – esquema 0-6 meses.	NÃO	SIM
	Hepatite B: três doses – esquema 0-1-6 meses.	SIM	
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. Vacinação combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B	NÃO	
HPV	Três doses: 0 - 1 a 2 - 6 meses. Duas vacinas estão disponíveis no Brasil: HPV4, licenciada para meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos e homens de 9 a 26 anos; e HPV2, licenciada para meninas e mulheres a partir dos 9 anos de idade.	NÃO	SIM
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tetano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP	Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa a cada dez anos.	SIM (dT)	SIM (dTpa e dTpa-VIP)
	Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.		
Dupla adulto (difteria e tetano) – dT	Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). A dTpa-VIP pode substituir a dTpa.		
Varicela (catapora)	Duas doses com intervalo de um a dois meses entre elas.	NÃO	SIM
Influenza (gripe)	Dose única anual.	SIM, 3V para maiores de 55 anos e grupos de risco em qualquer idade	SIM
Meningocócicas conjugadas ACWY/C	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	NÃO	SIM
Meningocócica B	Duas doses com intervalo de um a dois meses entre elas. De acordo com a situação epidemiológica.	NÃO	SIM
Febre amarela	Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal	SIM	SIM
Pneumocócicas	A vacinação entre 50-59 anos com VPC13 fica a critério médico.	NÃO	SIM
Herpes zóster	Uma dose. Licenciada a partir dos 50 anos, ficando a critério médico sua recomendação a partir dessa idade.	NÃO	SIM
Dengue	Três doses com intervalo de seis meses (0 - 6 - 12 meses). Licenciada para adultos até 45 anos.	NÃO	SIM

Ative suas defesas. Mantenha seu cartão de vacinas sempre atualizado.