# GUIA DE EXAMES **LABORATORIAIS**

Unimed Erechim

# Informações e Instruções para Exames Laboratoriais

**ALFA-HIDROXIPROGESTERONA**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas (coleta na parte da manhã)

**ACETONA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO 5-HIDROXI-INDOLACÉTICO**
Amostra: urina de 24 horas.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO CÍTRICO**
Amostra: esperma
Jejum: 8 horas
Abstinência sexual:3 dias
Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório. A coleta deve ser realizada nas dependências do laboratório.

**ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO FITÂNICO E PRISTÂNICO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9)**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ÁCIDO FÓLICO ERITROCITÁRIO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ÁCIDO FÓRMICO**
Amostra: urina final de jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO HIALURÔNICO**
Amostra: sangue
Jejum: 12 horas

**ÁCIDO HIPÚRICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO LÁTICO**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
Evitar exercício físico antes da coleta.
*É necessário comparecer ao laboratório para agendar a coleta

**ÁCIDO MANDÉLICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO METIL-ETIL-CETONA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO METIL-HIPÚRICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO METILMALÔNICO**
Amostra: Sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 anos: jejum de 3 horas.

**ÁCIDO TRANSMUCÔNICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO TRICLOROACÉTICO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO ÚRICO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: recomendado jejum de 8 horas.
Crianças: não é necessário jejum.

**ÁCIDO ÚRICO - AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina recente
Coleta:

Adultos fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório (80 ml). Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 1 hora) ou manter sob refrigeração.
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**ÁCIDO ÚRICO - URINA 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDO VALPRÓICO**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário.
Coleta: Estar há pelo menos 3 dias com dosagem estável da medicação. Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**ÁCIDO VANIL MANDÉLICO**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ÁCIDOS BILIARES**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**ACTH - HORMONIO ADRENOCORTICO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Informar medicamentos em uso.

**ADENOSINA DIAMINASE**
Amostra: diversas

Jejum: não necessário

**ALBUMINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*A coleta deve ser realizada obrigatoriamente na parte da manhã.

**ALDOLASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ALDOSTERONA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
Cuidados especiais:
Repouso de 15 minutos sentado antes da coleta ou conforme orientação médica.
Se a coleta for parte do teste postural, o repouso será de 30 minutos deitado após a inserção do cateter ou conforme orientação médica.
Medicamentos: a critério médico, devem ser suspensos, pelo menos duas semanas antes da realização do exame os anti-inflamatórios não-esteroides, estrógenos e anti-hipertensivos (beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, agentes bloqueadores da ação da angiotensina II, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e de alça, bloqueadores do canal de cálcio. A espironolactona deve ser suspensa 6 semanas antes da coleta.

**ALDOSTERONA EM URINA DE 24 HORA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório

**ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ALFA 2 MACROGLOBULINAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ALFA FETOPROTEINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ALFA TSH - SUBUNIDADE ALFA LIVRE**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**ALFA-1-ANTITRIPSINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ALFA-1-ANTITRIPSINA FECAL**
Amostra: fezes recentes
Coleta: Colher fezes recentemente emitidas e manter refrigerada até a entrega no laboratório. Não é necessária nenhuma dieta especial.
Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material.
Evitar o uso de laxantes, substâncias digestivas, contraste oral (utilizado em exames radiológicos) e supositórios nos 3 dias que antecedem o exame e no dia da coleta.
Defecar em vasilhame limpo e seco, fornecido pelo laboratório, próprio para coleta de fezes.
Volume recomendável: aproximadamente ½ frasco de fezes (fornecido pelo laboratório).

**ALUMINIO (SANGUE)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
Coleta: A coleta deve ser realizada pela manhã. Caso esteja usando vitaminas ou suplementos minerais, a coleta deve ser realizada antes da ingestão do medicamento.
Informar o uso de medicamentos.
Em caso de pacientes que fazem hemodiálise: a coleta deve ser realizada precedendo a sessão de diálise, antes da heparinização do paciente, ao final do maior período interdialítico ou conforme orientação médica.

**ALUMINIO EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**AMILASE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas.

**AMILASE EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**AMILASE PANCREÁTICA - ISOENZIMA**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário.

**ANCA C - ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANCA P - ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANDROSTENEDIOL GLUCORONIDEO**
Amostra: sangue
Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**ANDROSTENEDIONA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTI-TIREOGLOBULINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 A 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**ANTICOAGULANTE LUPICO**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*Informar se está em uso de anticoagulante e qual a dosagem

**ANTICORPOS ANTI -ESPERMATOZOIDES**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário

**ANTICORPOS ANTI ANTÍGENO HEPÁTICO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI SS-A / RO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI SS-B / LA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-ACTINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-ADENOVIRUS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-ADENOVIRUS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-AQUAPORINA IGG**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-BORDETELLA PERTUSSIS IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-CAMPYLOBACTER**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA - IGA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CAXUMBA - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CAXUMBA - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CENTRÔMERO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA/IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA/IGG/IG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-COLÁGENO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-COXSACKIE A9 – IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-COXSACKIE B (1-6)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-CROMATINA (HISTONA)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-DIFTERIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-DNA (DUPLA HÉLICE)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ANTICORPOS ANTI-DNA CADEIA SIMPLES**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-ENDOMÍSIO - IGA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-ENDOMÍSIO - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-ENDOMÍSIO - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ANTICORPOS ANTI-EPSTEIN BARR IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ANTICORPOS ANTI-ESCLERODERMA (SCL 70)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-ESQUISTOSSOMO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-FÍGADO E RIM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-FOSFATIDILINUSITOL**
Amostra: sangue
Jejum: 6 horas

**ANTICORPOS ANTI-FOSFATIDILSERINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-GAD**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-GIARDIA LAMBLIA IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-GIARDIA LAMBLIA - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-GLIADINA – IGA/IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-GONOCOCO - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZAE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-HU (ANTI-NÚCLEO DE NEURÔNIO)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ANTICORPOS ANTI-ILHOTA PANCREÁTICA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ANTICORPOS ANTI-INSULINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-JO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-MI2**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-MIELOPEROXIDASE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-MITOCÔNDRIA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-MULLERIANO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*Mulheres: colher a amostra entre o 2º e 7º dia do ciclo menstrual ou conforme orientação médica.

**ANTICORPOS ANTI-MÚSCULO ESTRIADO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-MÚSCULO LISO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-NUCLEOSSOMO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-PARVOVÍRUS B19 IGG/IGM**
Amostra: sangue

Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-PARVOVÍRUS B19**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-PEPTÍDEO CITRULINADO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-PEROXIDASE (TPO)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-PNEUMOCOCO**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**ANTICORPOS ANTI-PROTEINASES – PR3**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR BLOQUEADOR DE ACETIL-COA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-RETICULINA IGA/IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-RETICULINA - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-RICKETSIA RICKETTSII IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTICORPOS ANTI-RNP**
Amostra: sangue

Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-ROTAVIRUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-SINTETASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-STRONGYLOIDES IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTICORPOS ANTI-TÉTANO - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA/IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano:3 horas

**ANTICORPOS ANTI-YERSINIA ENTEROCOLÍTICA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTICORPOS ANTI-LIGADOR DO RECEPTOR DA ACETIL COA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ANTIESTREPTOLISINA O**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ANTIGENO CARCINOEMBRIONICO (CEA)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ANTITROMBINA III**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A critério médico, suspender o uso de anticoagulante oral por 4 semanas. Informar medicamentos em uso.

**APOLIPOPROTEINA A-1**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Não ingerir bebidas alcoólicas nas 72 horas que antecedem o exame.

**APOLIPOPROTEINA B**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 12 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*Não ingerir bebidas alcoólicas nas 72 horas que antecedem o exame

**APOLIPROTEINA E - ESTUDO GENÉTICO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ARILSULFATASE A**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Exame colhido de segundas à quartas feiras até as 11:00, exceto véspera de feriado.

**ARRAY PARA ANALISE DE ANOMALIAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Coletas realizadas de segunda a sexta-feira até as 11:00.
*É necessário se dirigir ao laboratório previamente para obter todas as informações referentes à coleta da amostra e

assinatura de termo de consentimento pelo médico solicitante.

**ARSENICO (SANGUE)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Durante 3 dias que antecedem a coleta, não ingerir frutos do mar.

**ASCA - ANTICORPOS ANTI-SACCHAROMICES**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ASPERGILLUS FUMIGATUS (TESTE DA PRECIPITINA)**
Amostra: sangue
Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**ATIVIDADE DO COFATOR DA RISTOCETINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**AVALIAÇÃO DOS LINFÓCITOS CD 20**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
*As coletas são realizadas de segunda a quinta-feira até às 11horas, exceto véspera de feriado.

**AVIDEZ CITOMEGALOVIRUS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**AVIDEZ PARA RUBEOLA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**BACILOSCOPIA (HANSENIASE)**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**BACTERIOSCOPICO**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**BACTERIOSCOPICO DE ESCARRO**
Amostra: escarro
Coleta: a coleta de escarro deve ser realizada em casa, preferencialmente pela manhã ao se levantar, antes da higiene oral e do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando e bochechando abundantemente. Fazer várias vezes inspirações profundas e tossir várias vezes procurando obter o material do fundo do peito. Recolher este material no frasco fornecido pelo laboratório, fechando-o logo após a coleta. É muito importante que o escarro não seja confundido e misturado com saliva ou com secreções do nariz. Enviar o mais rápido possível ao laboratório.

**BACTERIOSCÓPICO DE PRIMEIRO JATO**
Amostra: 1º jato de urina
Coleta: Após fazer a higiene íntima, colher o primeiro jato urinário da primeira urina da manhã, (o volume não deve ultrapassar 15 ml ou 1cm de urina dentro do frasco) diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Encaminhar em até 2 horas para o laboratório.

**BACTERIOSCÓPICO DE SECREÇÃO URETRAL**
Amostra: secreção uretral
Coleta: a coleta deve ser realizada no laboratório, pela parte da manhã e antes da primeira micção do dia. Salvo solicitação médica, estar há pelo menos 3 dias sem uso de antimicrobianos.

**BACTERIOSCOPICO DE SECREÇÃO VAGINAL**
Amostra: secreção vaginal
Coleta: a coleta deve ser realizada no laboratório, preferencialmente pela manhã, sem fazer uso de duchas vaginais, pomadas e óvulos. Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o exame e não estar menstruada (caso esteja, aguardar 48 horas após o término). Salvo solicitação médica, estar há pelo menos 3 dias sem uso de antimicrobianos.

**BCR - ABL - TESTE QUANTITATIVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Amostras coletadas de segunda a sextas-feira até as 12 horas. Preferencialmente agendar a coleta e retirar instruções no laboratório.

**BETA HCG QUANTITATIVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Pacientes menores de idade deverão estar acompanhadas do responsável legal.

**BETA-2 GLICOPROTEÍNA 1**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**BETA-2-MICROGLOBULINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**BETA-GLICOSIDASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada de segunda a quarta-feira até às 11 horas, exceto véspera de feriado.

**BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**BIOTINIDASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada na segunda e terça-feira até às 11 horas, exceto véspera de feriado.

**BRCA 1 E 2 - SEQUENCIAMENTO GENI**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada na segunda até às 11 horas, exceto véspera de feriado. É necessário se dirigir ao laboratório previamente para obter todas as informações referentes à coleta da amostra e assinatura de termo de consentimento pelo médico solicitante.

**BRUCELOSE (REAÇÃO DE AGLUTINAÇÃO)**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**BRUCELOSE - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**BRUCELOSE – IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**C - TELOPEPTIDEO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Salvo solicitação médica, a coleta deverá ser realizada pela manhã, até às 9:00 horas. Informar ao laboratório sobre o uso de medicamentos, data da última menstruação, mês de gestação.

**CA 125**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**CA 15-3**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CA 19-9**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CA 72-4**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CADEIAS LEVES - LAMBDA E KAPPA (SANGUE)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**CADEIAS LEVES KAPPA - URINA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CADEIAS LEVES LAMBDA - URINA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CÁDMIO – SANGUE**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**CÁDMIO - URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CÁLCIO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**CÁLCIO - AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina
Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório (80 ml). Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas).
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**CÁLCIO - URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CÁLCIO IÔNICO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Coletas de segunda a sexta-feira até as 11:00.

**CALCITONINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CÁLCULO RENAL - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA**
Amostra: diversas
Para obter informações, favor dirigir-se ao laboratório.

**CALPROTECTINA**
Amostra: fezes
Coleta: Colher aproximadamente metade do frasco de coleta fornecido pelo laboratório (sem conservante) e manter refrigerado até a entrega do material.
*Entregar a amostra de segunda a sexta-feira até às 11 horas

**CAPACIDADE FERROPEXICA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: 8 horas
Crianças: 4 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Caso esteja usando vitaminas ou suplementos minerais, a coleta deve ser realizada antes da ingestão do medicamento.

**CAPACIDADE LIVRE DE COMBINAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CAPTURA HIBRIDA HPV**
Amostra: diversas
A coleta deve ser realizada no laboratório.
*Mínimo de 08 horas sem higiene local para coleta peniana, anal ou genitália externa feminina.
*Se coleta uretral, coletar pela manhã antes da primeira micção do dia.
*Não estar menstruada. Aguardar 48 horas após o término da menstruação para realizar a coleta.
*Nas 72 horas que antecedem a coleta: não fazer exame digital (toque) ou assepsia endovaginal; manter abstinência sexual; não usar creme/óvulo vaginal, ducha ou realizar lavagem interna (endovaginal); não fazer ultrassom transvaginal ou colposcopia; não fazer peniscopia.
*É recomendável aguardar 3 meses após cauterização ou tratamento para testar a eficácia do tratamento.
Não realizamos a coleta do material de biópsia, pois trata-se de um procedimento médico.

**CARBAMAZEPINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas.
Coleta: Estar há pelo menos 3 dias com dosagem estável da medicação. Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**CARBOHIDRATO DEFICIENTE DE TRANSFERRINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**CARBOXIEMOGLOBINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

*A amostra de sangue deve ser coletada após a jornada de trabalho.

**CARIÓTIPO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Devido à instabilidade da amostra, as coletas devem ser agendadas. O médico assistente deve enviar a história clínica do paciente.

**CARIOTIPO DE LIQUIDO AMINIOTICO**
Amostra: líquido amniótico
Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CARIÓTIPO DE TECIDOS**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*O paciente deverá permanecer 30 minutos em repouso antes da coleta.
*É necessário manter dieta específica nos 2 dias que antecedem a coleta. Favor, dirigir-se ao laboratório para retirar as informações.

**CATECOLAMINAS URINÁRIAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CD16 (LINFÓCITO NATURAL KILLER)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*As coletas são realizadas de segunda a quinta-feira até às 11 horas, exceto vésperas de feriados.

**CELULAS HERPÉTICAS**
Amostra: diversas
*A coleta é realizada no laboratório. O paciente não pode estar em uso de medicamentos tópicos.

**CERULOPLASMINA**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário

**CETOSTEROIDES**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CHIKUNGUNYA -ANTICORPOS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**CHLAMYDIA TRACHOMATIS - PCR -1° JATO URINÁRIO**
Amostra: urina de 1º jato
Coleta: Após fazer a higiene íntima, colher o primeiro jato urinário da primeira urina da manhã, (o volume não deve ultrapassar 15 ml ou 1cm de urina dentro do frasco) diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Encaminhar em até 2 horas para o laboratório.

**CHLAMYDIA TRACHOMATIS - PCR -DIVERSOS**
Amostra: diversas
*Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PESQUISA**
Amostra: diversas
*Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CHUMBO - SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*O trabalhador deve estar em trabalho continuo nas últimas 4 semanas, sem afastamento maior que 4 dias.

**CHUMBO EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina de final de jornada de trabalho
*Para obter informações sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CICLOSPORINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Informar sobre o uso de medicações contendo ciclosporina. Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**CISTATINA C**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário

**CISTICERCOSE**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: 8 horas
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**CISTINA EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina
Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas) ou manter sob refrigeração.
Crianças de até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**CISTINA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CITOMEGALOVIRUS - IGG**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**CITOMEGALOVIRUS - IGM**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**CITRATURIA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CITRATÚRIA EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina
Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório (80 ml). Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas) ou manter sob refrigeração.
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**CLOBAZAM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**CLOMIPRAMINA (ANAFRANIL)**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**CLORO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**CLORO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CLOSTRIDIUM DIFFICILE - TOXINA A e B**
Amostra: fezes
Coleta:

Colher o material no frasco fornecido pelo laboratório (sem conservante). Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças utilizar coletor de urina, se necessário. Evitar o uso de laxantes, contraste oral (utilizado em exames radiológicos) e supositórios nos 3 dias que antecedem o exame e no dia da coleta. Não colher durante o período menstrual ou quando houver hemorroidas sangrantes. Aguardar no mínimo 48 horas após o sangramento ter cessado. É recomendado não ingerir bebida alcoólica nos três dias que antecedem ao teste. Verificar medicamentos em uso: medicamentos que podem causar sangramento gastrointestinal devem ter o seu uso suspenso 3 dias antes da coleta ou conforme orientação médica: aspirina, AAS, anti-inflamatórios não esteroides (diclofenaco), anticoagulantes, colchicina, reserpina, vitamina C, iodo, sulfato ferroso. As amostras podem ser mantidas até 2 horas sem refrigerar ou até 12 horas refrigeradas.

**CLOZAPINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**COAGULOGRAMA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**COBRE – SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**COBRE - URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**COBRE EM URINA 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**COLESTEROL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas

ou a critério médico.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas ou a critério médico.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas ou a critério médico.

**COLESTEROL HDL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas ou a critério médico.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas ou a critério médico.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas ou a critério médico.

**COLESTEROL LDL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas ou a critério médico.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas ou a critério médico.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas ou a critério médico.

**COLESTEROL VLDL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas ou a critério médico.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas ou a critério médico.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas ou a critério médico.

**COLINESTERASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**COLINESTERASE ERITROCITÁRIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Amostra colhida de segunda a sexta-feira até às 11:00

**COMPLEMENTO C1Q**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**COMPLEMENTO TOTAL - CH100**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**COMPLEMENTO TOTAL - CH50**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**COOMBS DIRETO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**COOMBS INDIRETO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**COPROCULTURA**
Amostra: fezes
Coleta: Adultos: as fezes podem ser coletadas em qualquer horário do dia, acondicionadas em frascos fornecidos pelo laboratório e encaminhadas em até 2 horas após a coleta.
Crianças em uso de fraldas: sugere-se forrar a fralda com saco plástico para evitar a absorção das fezes e, após a evacuação, transferi-las para frasco de coleta fornecido pelo laboratório. Entregar ao laboratório em até 2 horas.

**COPROLOGICO FUNCIONAL**
Amostra: fezes
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**COPROPORFIRINAS - PESQUISA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CORPOS CETÔNICOS - URINA**
Amostra: urina
Coleta: Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas).
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**CORTISOL - 8 HORAS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*A coleta pode ser realizada entre 7:30 e 8:30, idealmente às 8

horas.

**CORTISOL – 16 HORAS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*A coleta deve ser realizada o mais próximo possível das 16 horas.

**CORTISOL – 24 HORAS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*A coleta pode ser realizada entre 23:00 e 24:00.

**CORTISOL SALIVAR - 4 AMOSTRAS**
Amostra: saliva
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CORTISOL URINÁRIO**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CPK - CREATINA FOSFOQUINASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CPK - CREATINA FOSFOQUINASE ISOENZIMAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CPK - FRACAO MB**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CREATINA - SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CREATININA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**CREATININA EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina
Coleta: Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o

uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas).
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**CREATININA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CRIOAGLUTININAS**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**CRIOFIBRINOGÊNIO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**CRIOGLOBULINAS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**CRIPTOSPORIDIUM**
Amostra: fezes
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CROMAGRANINA A**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**CROMATOGRAFIA DE ACIDOS ORGÂNICOS NA URINA**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório

**CROMO - SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas.

**CROMO URINÁRIO**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**CROSS MATCH**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
Exame coletado SOMENTE na segunda-feira, até as 12:00. O casal deve comparecer para a coleta. É necessário se dirigir ao laboratório para agendar o exame e retirar o questionário a ser assinado pelo paciente e médico assistente.

**CULTURA**
Amostra: diversos
Para receber instruções sobre a coleta, favor dirigir-se ao laboratório.

**CULTURA DE ESCARRO**
Amostra: escarro
Coleta: a coleta de escarro deve ser realizada em casa, preferencialmente pela manhã ao se levantar, antes da higiene oral e do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando e bochechando abundantemente. Fazer várias vezes inspirações profundas e tossir várias vezes procurando obter o material do fundo do peito. Recolher este material no frasco fornecido pelo laboratório, fechando-o logo após a coleta. É muito importante que o escarro não seja confundido e misturado com saliva ou com secreções do nariz. Enviar o mais rápido possível ao laboratório.

**CULTURA DE FUNGOS EM ESCARRO**
Amostra: escarro
Coleta: a coleta de escarro deve ser realizada em casa, preferencialmente pela manhã ao se levantar, antes da higiene oral e do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando e bochechando abundantemente. Fazer várias vezes inspirações profundas e tossir várias vezes procurando obter o material do fundo do peito. Recolher este material no frasco fornecido pelo laboratório, fechando-o logo após a coleta. É muito importante que o escarro não seja confundido e misturado com saliva ou com secreções do nariz. Enviar o mais rápido possível ao laboratório.

**CULTURA DE FUNGOS**
Amostra: unha, raspado de pele, pelos, fios de cabelo e

material de biópsia
Instruções específicas dependente do tipo de material e lesão.
É necessário dirigir-se ao laboratório.

**CULTURA DE SECREÇÃO OCULAR**
Amostra: secreção ocular
*A coleta é realizada no laboratório. Comparecer ao laboratório sem lavar os olhos e sem maquiagem.
*Salvo solicitação médica, o paciente deve estar há pelo menos 3 dias sem o uso de antimicrobianos.

**CULTURA DE SECREÇÃO URETRAL**
Amostra: secreção uretral
Coleta: a coleta deve ser realizada no laboratório, pela parte da manhã e antes da primeira micção do dia. Salvo solicitação médica, estar há pelo menos 3 dias sem uso de antimicrobianos.

**CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL**
Amostra: secreção vaginal
Coleta: a coleta deve ser realizada no laboratório, preferencialmente pela manhã, sem fazer uso de duchas vaginais, pomadas e óvulos. Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o exame e não estar menstruada (caso esteja, aguardar 48 horas após o término). Salvo solicitação médica, estar há pelo menos 3 dias sem uso de antimicrobianos.

**CULTURA ESPERMA**
Amostra: esperma
A coleta deve ser realizada no laboratório.
É necessário comparecer ao laboratório para retirar as instruções de coleta.

**CULTURA MICOPLASMA**
Amostra: diversas
Instruções específicas dependente do tipo de material e lesão.
É necessário dirigir-se ao laboratório.

**CULTURA PARA CANDIDA ALBICANS**
Amostra: diversas
Instruções específicas dependente do tipo de material e lesão.
É necessário dirigir-se ao laboratório.

**CULTURA PARA MRSA - Staphylococcus aureus**
Amostra: diversas
Instruções específicas dependente do tipo de material e lesão.
É necessário dirigir-se ao laboratório.

**CULTURA UREAPLASMA**
Amostra: diversas
Instruções específicas dependente do tipo de material e lesão.

É necessário dirigir-se ao laboratório.

**CURVA GLICÊMICA**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*O teste deve ser realizado pela manhã, no estado de repouso.
*Após a coleta da amostra de jejum, é administrada uma solução oral de glicose e novas coletas são realizadas nos tempos especificados pelo médico solicitante, podendo o tempo de duração do teste variar entre 2 até 5 horas. É obrigatória a permanência no laboratório durante a realização do teste.

**CURVA GLICÊMICA PARA GESTANTES**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*Deve ser realizado da 24ª a 28ª semana gestacional. Pode ser realizado até a 32ª semana.
*Após a coleta da amostra de jejum, é administrada uma solução oral de glicose e outras duas coletas de sangue serão realizadas, na primeira e na segunda hora após a ingestão da solução. É obrigatória a permanência no laboratório durante a realização do teste, aproximadamente 2 horas.

**CURVA INSULINEMICA**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*O teste deve ser realizado pela manhã, no estado de repouso.
*Após a coleta da amostra de jejum, é administrada uma solução oral de glicose e novas coletas são realizadas nos tempos especificados pelo solicitante, podendo o tempo de duração do teste chegar até 5 horas. É obrigatória a permanência no laboratório durante a realização do teste.
D-DÍMEROS
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Informar ao laboratório sobre o uso de medicamentos, data da última menstruação, mês de gestação.

**DEHIDROTESTOSTERONA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.

Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Informar ao laboratório sobre o uso de medicamentos, data da última menstruação, mês de gestação.

**DENGUE IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**DENGUE IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**DENGUE TESTE RÁPIDO ANTIGENO E**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**DEOXIPIRIDINOLINA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**DEPURAÇÃO DE CREATININA ENDOGENA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**DEPURAÇÃO DE UREIA ENDOGENA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**DESMETILCLOMIPRAMINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**DESOXICORTISOL - COMPOSTOS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas (coleta na parte da manhã)

**DHEA SALIVAR**
Amostra: saliva
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a

mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**DIAZEPAN**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**DIFENILHIDANTOINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**DIGOXINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**DOENÇA DE CHAGAS - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**DOENÇA DE CHAGAS - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**DOENÇA DE CHAGAS - HEMAGLUTINAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
* Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**DOENÇA DE HUNTINGTON**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
* Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**DOENÇA DE KENNEDY**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
* Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**DOENÇA DE LYME - ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IGG/IGM**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**EXAME TOXICOLÓGICO - PARTICULAR**
Amostra: fios de cabelo ou pelos
*É necessário que os fios de cabelo tenham no mínimo 4 cm de comprimento ou no caso de pelos, é preciso ter quantidade aproximada a 3 colheres de sopa.
*É obrigatório o paciente estar munido de documento com foto.
*Menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal.
*Coletas realizadas de segunda a sexta-feira até às 17 horas.

**EXAME TOXICOLÓGICO - CNH**
Amostra: fios de cabelo ou pelos
*É necessário que os fios de cabelo tenham no mínimo 4 cm de comprimento ou no caso de pelos, é preciso ter quantidade aproximada a 3 colheres de sopa.
*É obrigatório o paciente estar munido da CNH.
*Coletas realizadas de segunda a sexta-feira até às 17 horas.

**EXAME TOXICOLÓGICO - CONCURSO**
Amostra: fios de cabelo ou pelos

*É necessário que os fios de cabelo tenham no mínimo 4 cm de comprimento ou no caso de pelos, é preciso ter quantidade aproximada a 3 colheres de sopa.
*É obrigatório o paciente estar munido de documento com foto e o edital do concurso.
*Menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal.
*Coletas realizadas de segunda a sexta-feira até às 17 horas.

**ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**ELETROFORESE DE PROTEINAS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ELETROFORESE DE PROTEINAS-URINA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ENTAMOEBA HISTOLYTICA IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ENTAMOEBA HISTOLYTICA IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ERITROGRAMA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ERITROPOIETINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**ERROS INATOS DO METABOLISMO**
Amostras: sangue e urina
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESPERMOGRAMA**
Amostra: esperma
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTANHO**
Amostra: urina
Coleta: Adultos: fazer higiene na genitália externa. Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato médio diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Desprezar o restante. Evitar relações sexuais na véspera da coleta. Não fazer o exame durante o período menstrual (salvo solicitação médica). Evitar o uso de cremes, pomadas ou óvulos vaginais. Trazer o material o mais breve possível ao laboratório (máximo 2 horas).
Crianças até 6 anos: caso não for possível desprezar o primeiro jato, proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta.
Crianças em uso de fraldas: comparecer ao laboratório para a coleta.

**ESTRADIOL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*Salvo orientação médica, a coleta deve ser realizada até às 9 horas.

**ESTRADIOL SALIVAR**
Amostra: saliva
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTRIOL**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**ESTRONA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*Salvo orientação médica, a coleta deve ser realizada até às 9 horas.

**ESTUDO GENETICO PESQUISA DE CADASIL**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
*Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTUDO DA INTOLERÊNCIA ALIMENTAR (A200)**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário.

**ESTUDO MOLECULAR DA ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 3**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
*Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTUDO MOLECULAR DA DISTROFIA MIOTÔNICA 1**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
* Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTUDO MOLECULAR DA SÍNDROME DE RETT**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
*Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTUDO MOLECULAR PARA DISTONIA DE TORSÃO (DYT1)**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário
*Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ETANOL EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
*Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ETANOL SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**EXAME COMUM DE URINA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.

Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**EXAME COMUM DE URINA - 1º JATO**
Amostra: 1ª urina da manhã
Instruções de coleta: Colher o primeiro jato urinário, não mais de 15 ml (no máximo 1cm de urina dentro do frasco), da

primeira urina da manhã, diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

**EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir as orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**EXOMA PARA DOENÇAS RARAS**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FATOR ANTI-NUCLEAR - HEP2**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**FATOR DE NECROSE TUMORAL**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FATOR II**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FATOR INTRÍNSECO AUTO ANTICORPORPOS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FATOR IX**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FATOR REUMATOIDE**
Amostra: sangue

Jejum: Adultos:8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**FATOR V DE LEIDEN**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FATOR VIII**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FENITOINA /DIFENILHIDANTOINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**FENOBARBITAL**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**FENOL - URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**FERRITINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FERRO**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: 8 horas
Crianças: 4 horas.
A coleta deve ser realizada pela manhã. Caso esteja usando vitaminas ou suplementos minerais, a coleta deve ser realizada

antes da ingestão do medicamento. Informar o uso de medicamentos.

**FIBRINOGÊNIO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**FIBROSE CISTICA - MUTAÇÃO - F/508**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário.
Colher de segunda a quinta-feira até 11 horas da manhã.

**FIBROSE CÍSTICA - ESTUDO GENÉTICO**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FIBROTESTE**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: 12 horas, mas sem exceder 14 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: Jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: Jejum de 3 horas.

**FILARIOSE**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FISH MICRODELEÇÃO 22Q11.2**
Amostra: sangue
Jejum: não é necessário

**FORMALDEÍDO = FORMOL**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**FOSFATASE ACIDA PROSTATICA**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**FOSFATASE ACIDA TOTAL**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**FOSFATASE ALCALINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**FOSFATASE ALCALINA OSSEA**
Amostra: sangue

Jejum:
Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**FOSFORO**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**FOSFORO EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.

Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de

duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**FOSFORO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**FRAÇÃO C2 DO COMPLEMENTO**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**FRAÇÃO C3 DO COMPLEMENTO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**FRAÇÃO C4 DO COMPLEMENTO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**FRUTOSAMINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**FRUTOSE**
Amostra: esperma
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**ESTANHO**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:

**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.

Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**FTA-ABS - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**FTA-ABS - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**GALACTOSE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**GAMA GLUTAMIL TRANFERASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**GASTRINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.
*Antes da coleta, o cliente deverá, a critério médico, suspender o uso de medicamentos inibidores da bomba protojônica (omeprazol e correlatos) por um período mínimo de 7 dias e desejável de 14 dias ou conforme orientação médica.
Medicamentos bloqueadores H2 (cimetidina, ranitidina e correlatos) devem ser suspensos por um período mínimo de 4 dias e desejável de 7 dias ou conforme orientação médica.

**GENE GCH1 - DISTONIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Colher somente nas segundas-feiras até as 11:00.

**GLICEMIA 1 HORA APÓS SOBRECARGARGA 50G**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*O teste deve ser realizado pela manhã, no estado de repouso.
*Após a coleta da amostra de jejum, é administrada uma solução oral de glicose e outra coleta é realizada 60 minutos após. É obrigatória a permanência no laboratório durante a realização do teste.

**GLICOSE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã, em estado de repouso.

**GLICOSE EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**GLICOSE 2 HORAS APÓS CAFÉ DA MANHÃ**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ANTES DA JANTA - 19:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE APÓS 30 MINUTOS DE INSULINA**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 11:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 13:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 14:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 16:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 16:30 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 17:00 HORAS**
Amostra: sangue

Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE ÀS 24:00 HORAS**
Amostra: sangue
Orientações: proceder normalmente a rotina de vida e comparecer ao laboratório para a coleta de sangue minutos antes do horário solicitado pelo médico.

**GLICOSE-6- FOSFATO DESIDROGENAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**GLOBULINA DE LIGAÇÃO DOS ESTERÓ**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**GLUCAGON**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**GLUTATIONA PEROXIDASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**GRUPO SANGUINEO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HAPTOGLOBINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMATOCRITO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada de segundas às sextas-feiras até às 11horas.

**HEMOCULTURA AUTOMATIZADA**
Amostra: sangue
*Salvo solicitação médica, estar há pelo menos 3 dias sem uso de antimicrobianos. Não é necessário jejum. Em caso de febre,

comparecer ao laboratório momentos antes dos picos febris.

**HEMOGLOBINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMOGLOBINA FETAL – DOSAGEM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMOGLOBINA GLICADA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMOGRAMA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**HEMOSSEDIMENTAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEMOSSIDERINA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.
**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.

Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta.

**HEPATITE A - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE A - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE A - ANTICORPOS TOTAIS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - ANTI-HBC IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - ANTI-HBC IGM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - ANTI-HBC TOTAL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - ANTI-HBE**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**HEPATITE B - ANTI-HBS**
Amostra: sangue
Jejum:
ADULTOS: mínimo de 8 horas.
CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS: 6 horas.
CRIANÇAS ABAIXO DE 1 ANO: 3 horas.

**HEPATITE B - ANTIGENO DE SUPERFICIE**
Amostra: sangue
Jejum:
ADULTOS: mínimo de 8 horas.
CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS: 6 horas.
CRIANÇAS ABAIXO DE 1 ANO: 3 horas.

**HEPATITE B - ANTIGENO E-HBEAG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - QUALITATIVO (DNA VIRAL)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE B - QUANTITATIVO (CARGA VIRAL)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE C - DETECÇÃO E GENOTIPAGEM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE C - GENOTIPAGEM DO VIRUS C**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE C – PESQUISA DE ANTICORPOS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HEPATITE C - QUALITATIVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE C - QUANTITATIVO (CARGA VIRAL)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HEPATITE DELTA - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HEPATITE DELTA - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HEPATITE E - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HEPATITE E - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES TIPO 6 - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES TIPO I - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES TIPO I - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES TIPO II - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES TIPO II - ANTICORPOS IGM**

Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HERPES ZOSTER - IGG (VARICELA ZOSTER)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas.

**HERPES ZOSTER - IGM (VARICELA ZOSTER)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HEXANODIONA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**HIDATIDOSE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**HIDROXIESTEROIDES**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**HIDROXI-PREGNENOLONA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas (coleta na parte da manhã)

**HISTAMINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HISTONA, ELISA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HISTOPLASMOSE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.

Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HIV - PCR QUALITATIVO/QUANTITATIVO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**HIV - ANTICORPOS 1 E 2**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
*Menor de idade de deverá estar acompanhado de responsável legal.

**HLA - B27**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HOMA - ÍNDICE HOMA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HOMA BETA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HOMOCISTEINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**HORMÔNIO ANTI-DIURÉTICO - VASOPRESSINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*É necessário permanecer em repouso por 1 horas antes da coleta. Evitar stress físico no dia da coleta.

**HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HGH**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**HORMÔNIO ESTIMULADOR DA TIREOIDE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.

Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Informar medicações em uso.

**HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Para mulheres: informar a data da última menstruação.

**HORMÔNIO LUTEINIZANTE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
*A coleta deve ser realizada pela manhã. Para mulheres: informar a data da última menstruação.

**HTLV - ANTICORPOS I/II**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECIFICO CARANGUEJO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA BOTRYTIS CINEREA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA FUSARIUM MOLINIFORME**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA MUCOR RACEMOSUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ISAC**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE PARA PHADIATOP INFANTIL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGFBP3 - PROTEINA LIGADORA DE FATORES DE CRESCIMENTO**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**IMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTES**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**IMUNOFIXAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**IMUNOFIXAÇÃO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**IMUNOGLOBULINA A - IGA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IMUNOGLOBULINA E - IGE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IMUNOGLOBULINA G - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**IMUNOGLOBULINA A - SALIVAR**
Amostra: saliva
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório. É preciso agendar a coleta, pois este exame necessita de kit de coleta especial.

**IMUNOGLOBULINA D - IGD**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ÍNDICE DE ANDROGÊNIOS LIVRES**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.
*Informar medicamentos em uso (inclusive pomadas e cremes).
*Para mulher (informar uso de anticoncepcional).
*Informar dia e hora da última medicação.

**ÍNDICE DE SATURAÇÃO TRANSFERRINA**
Amostra: sangue

Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
*A coleta deve ser pela manhã.

**INDICE DE TIROXINA LIVRE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**INIBIDOR DA C1 ESTERASE – QUANTITATIVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**INIBIDOR DA C1 ESTERASE FUNCIONA**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**INIBIDOR DO FATOR VIII**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.
*É necessário informar dados clínicos: indicação clínica do exame, histórico próprio ou familiar de sangramento, uso de anticoagulante, TP e KTTP alterados.

**INIBINA - BA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**INSULINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**INTERLEUCINA 1**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**INTERLEUCINA 10**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**INTERLEUCINA 6**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**INTERLEUCINA 8**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**ISO – HEMAGLUTININAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.
*Coletar de segunda a sexta-feira até as 11:00.

**LACTOFERRINA**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**LAMOTRIGINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**LDH - DESIDROGENASE LACTICA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**LDL OXIDADA (LDL PEROXIDADA)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LEGIONELLA - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LEGIONELLA - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LEISHMANIOSE - PESQUISA**
Amostra: diversas
*Instruções de coleta específicas no laboratório.

**LEISHMANIOSE - PRC**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Amostra coletada de segunda a sexta-feira.

**LEPTINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**LEPTOSPIROSE – SOROAGLUTINAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LEUCOGRAMA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**LICOPENO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.

Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LIPASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Pacientes em uso de dipirona, devem tomar a medicação depois da coleta.

**LIPÍDEOS TOTAIS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 12 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**LIPOPROTEINA A**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**LISTERIOSE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 12 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas

**LITIO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**MACROPROLACTINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**MAGNÉSIO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**MAGNÉSIO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**MALARIA - ANTICORPOS IGG E IGM**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**MANGANES URINÁRIO**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
**MDA - DIALDEIDO-MALÔNICO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**MERCURIO (SANGUE TOTAL)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**MERCURIO (URINA)**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**METAHEMOGLOBINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**METANEFRINAS PLASMÁTICAS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**METANEFRINAS URINÁRIAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**METANOL**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**MICOLÓGICO DIRETO**
Amostra: diversas
A coleta da amostra é realizada no laboratório, exceto biópsia que é procedimento médico.
Orientações gerais:
O paciente não deve estar em uso de medicações antifúngicas de uso tópico ou oral no momento da coleta. Após o uso destes medicamentos, deve aguardar, no mínimo, 7 dias no caso de antifúngico tópico e 15 dias se medicação via oral para, então, realizar a coleta ou conforme orientação do médico.
Uso de pomadas e cremes comuns (lavar e realizar a coleta no

dia seguinte).
Uso de esmalte e acetona (remover o esmalte e ficar no mínimo 72 horas sem o uso destas substâncias).
Unha com limpeza em manicure e pedicure (aguardar 15 dias).
Não lavar o couro cabeludo ou região da barba no dia da coleta.
Quando as lesões são nos pés: lavar e secar os pés no dia anterior à coleta e ir ao laboratório com calçado fechado.
Sempre que possível, informar a suspeita médica para direcionar melhor a pesquisa.

**MICROALBUMINÚRIA EM AMOSTRA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.

Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.

Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**MICROALBUMINÚRIA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**MICRODELEÇÕES DO CROMOSSOMO**
Amostra: sangue
Instruções específicas no laboratório.

**MIDAZOLAN (DORMONID)**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**MITOTANO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**MONOTESTE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**MORFOLOGIA ESTRITA DE KRUGER**
Amostra: esperma
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**MUTAÇÃO DO GENE 21-HIDROXILASSE**
Amostra: sangue
Para obter informações sobre a coleta, é necessário dirigir-se ao laboratório.

**MUTAÇÃO DO GENE DA PROTROMBINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*A coleta deve ser realizada de segunda a sexta-feira até às 11horas. Véspera de feriados não realizamos está coleta.

**MUTAÇÃO DO GENE METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada de segunda a sexta-feira até as 11:00. Véspera de feriados não realizamos está coleta.

**MUTAÇÃO V617F NO GENE JAK 2**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada de segunda a sexta-feira até as 11:00. Véspera de feriados não realizamos está coleta.

**NEISSERIA GONORRHOEAE - PCR**
Amostra: diversas
Para obter orientações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**NÍQUEL EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**NÍQUEL – SANGUE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**NORTRIPTILINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do

medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**OSMOLALIDADE - URINA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o

primeiro jato e proceder a coleta.

**OSMOLALIDADE PLASMATICA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**OSTEOCALCINA**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**OSTEOGENESE IMPERFEITA**
Amostra: sangue
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**OXALÚRIA EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.

Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**OXALÚRIA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**OXCARBAZEPINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**P-AMINOFENOL**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**TESTE DE PATERNIDADE**
Amostra: sangue
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PCR PARA TOXOPLASMOSE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PEPTÍDEO C**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PEPTÍDIO NATRIURÉTICO CEREBRAL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PESQUISA DE ANFETAMINAS**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE BAAR**
Amostra: diversas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**PESQUISA DE BARBITÚRICOS**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE BENZODIAZEPÍNICOS**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE CÉLULAS HERPÉTICAS**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PESQUISA DE COCAINA**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE EOSINÓFILOS**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PESQUISA DE FUNGOS - FEZES/URINA**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PESQUISA DE GORDURA FECAL**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**PESQUISA DE HAEMOPHYLUS DUCREY**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PESQUISA DE HEMÁCIAS DISMÓRFICA**
Amostra: urina – jato médio da segunda micção do dia (a coleta deve ser realizada no laboratório)
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**PESQUISA DE LARVAS (BAERMANN E MORAES)**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**PESQUISA DE LEUCÓCITOS FECAIS**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**PESQUISA DE MACONHA**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE MUTAÇÃO PARA INTOLERÂNCIA A LACTOSE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PESQUISA DE OPIACEOS**
Amostra: urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.
*Paciente menores de idade, precisam estar acompanhados do responsável legal.

**PESQUISA DE OXIURUS**
Amostra: fita gomada
A coleta é realizada no laboratório. Para maiores informações, é necessário se dirigir ao laboratório.

**PESQUISA DE SANGUE OCULTO**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco

(catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**PESQUISA DONOVANOSE**
Amostra: diversas
Para obter informações sobre a coleta, é necessário comparecer ao laboratório.

**PESQUISA GENÉTICA PARA DOENÇA SEGAWA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*Coletar apenas na segunda-feira até às 11:00.
*É necessário comparecer ao laboratório para agendar a coleta e retirar a documentação a ser assinada pelo paciente e médico assistente.

**PESQUISA MOLECULAR DA ATAXIA DE FRIEDREICH**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.

**PESQUISA MOLECULAR PARA X-FRÁGIL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário.
*Este exame só pode ser coletado de segunda a sexta-feira, exceto véspera de feriados.

**PESQUISA STREPTOCOCCUS GRUPO B**
Amostra: Swab anal e vaginal
A amostra é colhida no laboratório.
*É necessário manter abstinência sexual nas últimas 48 horas, além de não usar ducha ginecológica, antissépticos ou medicações tópicas.

**PH FECAL**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja

analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir as orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**PLAQUETAS**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**PLASMINOGÊNIO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PORFOBILINOGENIO**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**POTÁSSIO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**POTÁSSIO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**POTÁSSIO EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina – jato médio da segunda micção do dia (a coleta deve ser realizada no laboratório)
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.

Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.

Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**PRÉ ALBUMINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**PREGNENOLONA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**PRÓ-INSULINA**
Amostra: sangue
Jejum: 12 horas

**PROGESTERONA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**PROGESTERONA SALIVAR**
Amostra: saliva
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**PROLACTINA**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*Não realizar atividade física antes da coleta. O paciente deve ficar 20 minutos em repouso antes de realizar a coleta.

**PROLACTINA – POOL**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*Não realizar atividade física antes da coleta. O paciente deve ficar 20 minutos em repouso antes de realizar a coleta.
*Serão colhidas 3 amostras, uma a cada 20 minutos, totalizando o tempo de 60 minutos de coleta.

**PROLACTINA APÓS DILUIÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*Não realizar atividade física antes da coleta. O paciente deve ficar 20 minutos em repouso antes de realizar a coleta.

**PROPEPTIDEO PROCOLAGENO TIPO I**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**PROTEINA C FUNCIONAL**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**PROTEINA C REATIVA**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.

**PROTEINA C REATIVA - ULTRASENSIVEL**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**PROTEINA P RIBOSSOMAL, ANTICORPOS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PROTEINA S ANTIGÊNICA TOTAL**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**PROTEINA S LIVRE**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas

**PROTEINA TRANSPORTADORA DO RETINOL**
Amostra: urina – jato médio da segunda micção do dia (a coleta deve ser realizada no laboratório)
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.

Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.
**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**PROTEINA TRANSPORTADORA DO RETINOL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**PROTEINAS TOTAIS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
A coleta deve ser pela manhã.

**PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: jejum mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: jejum de 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: jejum de 3 horas.
A coleta deve ser pela manhã.

**PROTEINURIA EM AMOSTRA DE URINA**
Amostra: urina – jato médio da segunda micção do dia (a coleta deve ser realizada no laboratório)
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.

Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.
Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.

Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.
**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta

**PROTEINURIA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**PSA TOTAL E LIVRE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*É necessária abstinência sexual de 48 horas.
*Aguardar 5 dias para coletar, caso tenha realizado sondagem uretral, toque retal, ultrassom retal.
*Aguardar 15 dias para coletar, caso tenha realizado colonoscopia e 30 dias para biópsia.
*Nos dois dias que antecedem a coleta, evitar ciclismo,

equitação ou andar de motocicleta por mais de 30 minutos.

**PARATORMÔNIO (PTH)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**RAPAMICINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**IGE ESPECIFICA PARA NAPRO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASTANHA D**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECIFICA PARA NOZ**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DIPIRONA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ABACAXI**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ABELHA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ACARUS SIRO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ACIDO ACETIL SALICILICO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ACIDO CLAVULANICO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ALFA LACTOALBUMINA (PROTEÍNA DO LEITE)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ALHO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS I (TRIGO, AVEIA)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS II (PEIXES E FRUTOS DO MAR)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS III (AMENDOIM, AVELÃ)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS V (CLARA DE OVO)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS X**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA AMEIXA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA AMENDOIM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA AMOXICILINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ARVORES (OLIVEIRA, ACÁCIA)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ASCARIS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARARAST - ASPERGILUS FUMIGATOS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ATUM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA AVEIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BANANA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BARATA (BLATELA GERMANICA)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BARATA DE ESGOTO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BATATA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BETA LACTOGLOBULINA (PROTEÍNA DO LEITE)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA BLOMIA TROPICALIS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CACAU**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CAMARÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CARNE DE FRANGO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CARNE DE PORCO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CARNE DE VACA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASEINA (PROTEINAS DO LEITE)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASPA DE CÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASPA DE CAVALO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASTANHA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CEFALOSPORINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CENTEIO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CETOPROFENO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CEVADA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CLARA DE OVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CORANTE AMARELO (TARTRAZINA)**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARACORANTE VERMELHO (COCHONILHA)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DERMATOFAGOIDES FARINAE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DERMATOFAGOIDES PTERONY**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DICLOFENACO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DOLICHOVESPULA ARENARIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA DOLICHOVESPULA MACULATA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA EPITELIO E CASPA DE GATO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA FEIJÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA FORMIGA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA FUNGOS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GEMA DE OVO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GERGELIN**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GLUTEN**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GLYCYPHAGUS DOMESTICUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GRAMÍNEAS (GX1)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GRAMÍNEAS (GX2)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GRAMÍNEAS (GX3)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GRAMÍNEAS (GX4)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECIFICO PARA CEFALEXINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECIFICO PARA FICUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECIFICO SEMENTE DE GIRASSOL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA KIWI**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LÃ DE OVELHA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LAGOSTA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LARANJA**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LÁTEX**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LEITE DE VACA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LEVEDURA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LIGUSTRUS VULGARIS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MARIMBONDO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MARISCO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MEL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MELÂNCIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MILHO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MORANGO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MOSCA MUTUCA (TABANUS)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ÔMEGA-5 (GLIADINA)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA OVO DE GALINHA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA OVOALBUMINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA OVOMUCOIDE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PARACETAMOL**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÊLO DE ANIMAIS I**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÊLO DE ANIMAIS II**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÊLO DE CARNEIRO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PENA DE GALINHA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PENAS DE ANIMAIS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PENICILINA G**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PERNILONGO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PESSEGO**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PIMENTA DO CHILE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PIROXICAM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PLATANUS ACERIFOLIA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PO CASEIRO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA POEIRA DOMÉSTICA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN D ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN D ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DE ÁRVORES E ARBUST**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA RAST - PÓLEN DE ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DO LOLIUM PERENNE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA SALMÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA SOJA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TOMATE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TRIGO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TROPOMIOSINA RECOMBINANTE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA VESPA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA VESPÃO CABRO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CEBOLA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CENOURA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ESPECÍFICO PARA AMÊNDOA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CASTANHA DO PARÁ**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ESPECÍFICO PARA PASPALUM**
Amostra: sangue

Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA HOLCUS LANATUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ABÓBORA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ALTERNARIA ALTERNATA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA CIPRESTE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA GRAMINEA MILHO (G202)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA HORDEUM VULGARE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA LIMÃO**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MALTE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA MANGA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PINUS STROBUS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PARVOALBUMINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PHLEUM PRATENSE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA POA PRATENSIS (G8)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA PÓLEN DE ÁRVORES**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA ABACAXI SECALE CEREALE (G12)**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TANGERINA**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TRITICUM SATIVUM**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**IGE ESPECÍFICA PARA TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**RELAÇÃO FENILALANINA/TIROSINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**RELAÇÃO IODO SALIVAR/URINÁRIO**
Amostra: saliva e urina
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**RENINA PLASMÁTICA - 15 MINUTOS SENTADO**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário
* É necessário ficar em repouso por 15 minutos (sentado) antes da coleta. Coletar até às 11horas.
*Medicamentos: a critério médico, devem ser suspensos, pelo menos duas semanas antes da realização do exame os anti-inflamatórios não-esteroides, estrógenos e anti-hipertensivos (beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, agentes bloqueadores da ação da angiotensina II, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e de alça, bloqueadores do canal de cálcio). A espironolactona deve ser suspensa 6 semanas antes da coleta.

**RENINA PLASMÁTICA - 30 MINUTOS DE REPOUSO**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário
* É necessário ficar em repouso por 30 minutos (deitado) antes da coleta. Coletar até às 11 horas.
*Medicamentos: a critério médico, devem ser suspensos, pelo menos duas semanas antes da realização do exame os anti-inflamatórios não-esteroides, estrógenos e anti-hipertensivos (beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, agentes bloqueadores da ação da angiotensina II, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e de alça, bloqueadores do canal de cálcio). A espironolactona deve ser suspensa 6 semanas antes da coleta.

**RESERVA ALCALINA**
Amostra: sangue
Jejum: Não necessário
*Coletar de segunda a sexta-feira até às 11 horas.

**RESISTÊNCIA À PROTEÍNA C ATIVADA**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**RETICULOCITOS**
Amostra: sangue
Jejum: não necessário

**RISCO FETAL - TESTE COMBINADO**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**ROTAVIRUS**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter

feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir as orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**RUBEOLA - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**RUBEOLA - ANTICORPOS IGM**
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SARAMPO - ANTICORPOS IGG**
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SARAMPO - ANTICORPOS IGM**
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SELENIO**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**SEQUENCIAMENTO DO GENE KCN-E1**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**SEQUENCIAMENTO GENETICO DE CR**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**SEROTONINA**
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*Nas 24 horas que antecedem o exame, é necessário fazer dieta livre de abacate, banana, berinjela, conservas de picles, nozes e tomate.
*Conforme orientação do seu médico assistente, o paciente deverá permanecer 7 dias sem ingerir os seguintes medicamentos: Paracetamol, Guafenesin, Imipramina, Inibidores da MAO, Lítio, Metildopa, Morfina, Naproxeno

(Naprosyn), Reserpina.

**SEXAGEM FETAL**
Amostra: sangue
*Requer agendamento, pois para realização deste exame é necessário providenciar kit especial.

**SÍNDROME DE BRUGADA - PESQUISA**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**SÍNDROME DE WILLIAMS (7q11.23q22)**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**SÍNDROME FANCONI - QUEBRAS CROMOSSÔMICAS**
Amostra: sangue
É necessário comparecer ao laboratório para obter informações sobre a coleta.

**SÓDIO**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**SÓDIO EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**SOMATOMEDINA C FATOR DE CRESCIMENTO**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**STRONGYLOIDES - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**SUB-POPULAÇÃO LINFOCITÁRIA - CD4**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
*As coletas são realizadas de segunda a quinta-feira até às 11 horas, exceto véspera de feriado.

**SUB-POPULAÇÃO LINFOCITÁRIA - CD8**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
*As coletas são realizadas de segunda a quinta-feira até às 11horas, exceto véspera de feriado.

**SUBCLASSES - IGG1**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SUBCLASSES - IGG2**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SUBCLASSES - IGG3**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SUBCLASSES - IGG4**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES**
Amostra: fezes
Instruções de coleta:
Para a coleta, retirar o frasco apropriado no laboratório. Evacuar em local limpo e seco, recolher com a ajuda da pazinha que acompanha o kit o equivalente a pelo menos uma colher de sopa de fezes. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim). Sempre que houver muco (catarro), pus ou sangue, colher está porção para que seja analisada, informando a presença dessas substâncias ao entregar o material. Caso seja visualizado algum parasita, coletá-lo informando o achado a atendente no momento da entrega do material para o adequado processamento da amostra.
Não utilizar leite de magnésia ou laxantes oleosos e nem ter feito uso de contraste radiológico pelo menos 3 dias antes da coleta do material. Seguir as orientações médicas quanto ao uso de medicamentos.

**SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTER**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
*A coleta deve ser realizada pela manhã, até às 9 horas.

**SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA**
Amostra: sangue

Jejum: não obrigatório
*A coleta deve ser realizada pela manhã, até às 9 horas.

**SUP-POPULAÇÃO LINFOCITÁRIA - CD4**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório
*As coletas são realizadas de segunda a quinta-feira até às 11 horas, exceto véspera de feriado.

**T3 - TRIIODOTIRONINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**T3 RETENÇÃO- CAPTAÇÃO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**T3 REVERSO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**T4 - TETRAIODOTIRONINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TBG - GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TEMPO DE PROTROMBINA - TP**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**TEMPO TROMB. PARCIAL (KTTP)**
Amostra: sangue

Jejum: 4 horas

**TEOFILINA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**TESTE DE TOLERÂNCIA À LACTOSE**
Amostra: sangue
Jejum: 8 horas
*O teste deve ser realizado pela manhã, no estado de repouso.
*Após a coleta da amostra de jejum, é administrada uma solução oral de lactose e novas coletas são realizadas nos tempos 30, 60, 90 e 120 minutos.
É obrigatória a permanência no laboratório durante a realização do teste

**TESTE DO PEZINHO AMPLIADO**
Amostra: sangue em papel filtro
Jejum: 2 horas
*Colher a partir do 3º dia de vida (preferencialmente do 3º ao 5)

**TESTOSTERONA LIVRE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TESTOSTERONA LIVRE SALIVAR**
Amostra: saliva
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**TESTOSTERONA TOTAL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TGO (AST)**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**TGP (ALT)**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**TIREOGLOBULINA - HTG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TIREOGLOBULINA ULTRA SENSÍVEL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TIROXINA LIVRE - FT4**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TOPIRAMATO**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas
*Comparecer para a coleta pouco antes da administração da próxima dose do medicamento (caso haja necessidade de coletar fora do horário de expediente, comparecer ao laboratório para agendar a coleta). Informar nome do medicamento, dose e horário da última ingestão. Quando houver suspeita de intoxicação, a coleta é realizada em qualquer horário do dia.

**TOXOCARA - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TOXOPLASMOSE - IGA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.

Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**TOXOPLASMOSE - IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**TOXOPLASMOSE - IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**TRAB - ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DE TSH**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TRANSFERRINA**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**TRIGLICERÍDEOS**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 12 horas, mas sem exceder 14 horas ou a critério médico.
CRIANÇAS DE 1 a 5 ANOS: 6 horas ou a critério médico.
CRIANÇAS ABAIXO DE 1 ANO: 3 horas ou a critério médico.

**TRIIODOTIRONINA LIVRE-FT3**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas
*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TRIPTASE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

*A coleta deve ser realizada pela manhã.

**TROPONINAT**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**URÉIA**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**URÉIA EM URINA DE 24 HORAS**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**UREIA PÓS HEMODIÁLISE**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**UROCULTURA**
Amostra: primeira urina do dia ou após 3 horas de retenção urinária
Instruções de coleta:
**SEXO MASCULINO**
Lavar as mãos com água e sabão
Retrair o prepúcio para expor o meato uretral.
Lavar a glande com água e sabão, começando pelo meato uretral.
Enxugar, utilizando gaze ou toalha, a partir do meato uretral.
Com uma das mãos manter o prepúcio retraído.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta de urina já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até cerca de 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante de urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**SEXO FEMININO:** (abstinência sexual de 2 dias)
Lavar as mãos com água e sabão
Fazer higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, talcos e cremes vaginais eventualmente utilizados, sejam totalmente removidos.
Enxugar toda a região genital com gaze ou toalha, sempre no sentido de frente para trás.

Com uma das mãos, manter os grandes lábios separados.
Com a outra mão, segurar o frasco de coleta já destampado.
Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário.
Coletar urina do jato médio até, mais ou menos, 1/3 ou metade da capacidade do frasco.
Desprezar o restante da urina no vaso sanitário.
Fechar o frasco de coleta.
Encaminhar o frasco para o laboratório no prazo máximo de duas horas, mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.
OBS.: DEVE-SE EVITAR COLETA DE URINA DURANTE O PERIODO MENSTRUAL. SE NÃO FOR POSSÍVEL, AVALIAR A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO VAGINAL. NECESSÁRIO ABSTINÊNCIA SEXUAL DE NO MÍNIMO 2 DIAS.

**CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS**: proceder cuidadosa higiene com água e sabão antes da coleta e caso seja possível, desprezar o primeiro jato e proceder a coleta.

**CRIANÇAS EM USO DE FRALDAS**: comparecer ao laboratório para a coleta.

**UROCULTURA DE 1º JATO URINÁRIO**
Amostra: 1º jato de urina
Coleta: Após fazer a higiene íntima, colher o primeiro jato urinário da primeira urina da manhã, (o volume não deve ultrapassar 15 ml ou 1cm de urina dentro do frasco) diretamente no frasco fornecido pelo laboratório. Encaminhar em até 2 horas para o laboratório.

**UROPORFIRINAS - ANÁLISE QUALITATIVA**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**UROPORFIRINAS - ANÁLISE QUANTITATIVO**
Amostra: urina de 24 horas
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**VARICELA - ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VDRL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.

Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA A**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA B 12 (CIANOCOBALAMINA)**
Amostra: sangue
Jejum: 4 horas

**VITAMINA B1 (TIAMINA)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA B3**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA B6 (PIRIDOXAL 5 FOSFATO)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA D3 – 25 - HIDROXIVITAMINA**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**VITAMINA E = TOCOFEROL**
Amostra: sangue

Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**WAALER-ROSE**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**WIDAL**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ZIKA VIRUS - TESTE MOLECULAR**
Amostra: sangue
Jejum: não obrigatório

**ZIKA VIRUS ANTICORPOS IGG**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ZIKA VIRUS ANTICORPOS IGM**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ZINCO - SÉRICO (SORO)**
Amostra: sangue
Jejum: Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas

**ZINCO EM AMOSTRA URINA**
Amostra: urina pré ou pós jornada de trabalho.
Para retirar o recipiente de coleta e obter informações sobre a mesma, favor dirigir-se ao laboratório.

**ZINCO ERITROCITÁRIO - PROTOPORFIRINA**
Amostra: sangue
Jejum:
Adultos: mínimo de 8 horas.
Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas.
Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas




ANS Nº 35702-2