

CALENDÁRIO VACINAL 2021/2022

Do nascimento à terceira idade

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS						
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS	NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*				
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM	SIM	NÃO						
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM	SIM	SIM							
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							CONTRAINDICADA																				SIM	SIM	NÃO
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)						SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa							
<i>Haemophilus influenzae b</i>	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13							
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY							
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses De 24 meses a 19 anos: duas doses						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				NÃO	SIM	NÃO					
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																				SIM	NÃO	NÃO							
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																				SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM							
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																				SIM	SIM	NÃO							
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, até 59 anos	SIM	NÃO							
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM							
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM							
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)				SIM	SIM							
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco						Duas doses com intervalo de cinco anos			NÃO	SIM	SIM							
Herpes zóster																		De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO						
Dengue	CONTRAINDICADA														Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses				CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO							

10/05/2021 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBlm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBlm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em <http://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros-referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf>
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBlm pacientes especiais*.

 Rotina  Vacinar não vacinados  Situações especiais  Contraindicada