

PROTOCOLO PARA BLOQUEIOS / DENERVAÇÃO /
RIZOTOMIA PERCUTÂNEA EM COLUNA

Dr. Gumercio P. Faria Filho
Diretor Técnico Médico
CRM - RJ 5246804-6

Unimed 
Costa do Sol

www.unimed.coop.br/costadosol
Rua Euzébio de Queiroz, 454
27910-230 Centro, Macaé - RJ
T.(22) 2105-8000

DADOS DO PACIENTE

Nome: _____

Nº carteira Unimed: _____ Nome do médico assistente: _____

Códigos de procedimentos solicitados: _____

Segmento solicitado: _____

1. Tem limitações físicas das atividades de vida diária (AVD'S)? Sim Não

2. Há quanto tempo apresenta limitações das AVD'S? _____

3. Fez tratamento conservador? Sim Não. Quais e por quanto tempo?

4. Tem hérnia discal? Sim Não

5. Tem sinais de estenose ou instabilidade cirúrgica? Sim Não

6. Tem cirurgia prévia no segmento a ser tratado? Não Sim/Quais?

7. Já realizou bloqueio anestésico facetário ou foraminal antes? Qual resultado? (% de melhora)

Dr (a). _____

Especialidade: _____

CRM _____, _____ de _____ de _____

PROTOCOLO PARA BLOQUEIOS / DENERVAÇÃO / RIZOTOMIA PERCUTÂNEA EM COLUNA

Dr. Gumericino P. Faria Filho
Diretor Técnico Médico
CRM - RJ 5246804-6

Unimed 
Costa do Sol

www.unimed.coop.br/costadosol
Rua Euzébio de Queiroz, 454
27910-230 Centro, Macaé - RJ
T.(22) 2105-8000

O PROCEDIMENTO TEM INDICAÇÃO NOS SEGUINTE CENÁRIOS:

1 - Dor Radicular Lombar:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

2- Claudicação Neurogênica:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

3- Dor Lombar Baixa, sem sintomas em membros inferiores apenas se:

- Atletas de alto rendimento durante o período de competição
- Grávidas com dor lombar que não respondem a outras formas de tratamento

Não mais que duas injeções na mesma sessão, 3 em 06 meses 6 em 1 ano. As duas injeções da mesma sessão podem ser bilaterais em um único nível ou, unilaterais em dois níveis.