



SARAMPO

Entenda a importância da vacinação

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade, principalmente crianças e pode causar a morte.

A transmissão ocorre por meio de secreções ao tossir, espirrar ou falar.

Campanha Nacional de Vacinação contra

Sarampo e Poliomielite

6 a 31
agosto
2018

Todas as crianças de um ano a menores de cinco deverão receber a vacina contra o sarampo, independentemente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.



Sinais e Sintomas

Febre
Dor de cabeça
Tosse
Coriza
Manchas vermelhas

Prevenção

A vacina é a única maneira de prevenir a doença. Após o término da Campanha Nacional, o Ministério da Saúde recomenda que, crianças maiores de cinco anos e adultos que não se vacinaram anteriormente, atualizem a caderneta de vacinação, conforme abaixo:

Crianças de 5 anos a 9 anos de idade que perderam a oportunidade de serem vacinados anteriormente

Duas doses da vacina tríplice viral

Pessoas de 10 a 29 anos

Duas doses da vacina tríplice viral

Pessoas de 30 a 49 anos

Uma dose da vacina tríplice viral

Fontes: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Unimed

Material produzido pela equipe de comunicação do Portal Unimed.