

Protocolo para Bloqueios/ denervação/ Rizotomia percutânea em coluna

Dados do paciente

Nome:

Número da carteira da UNIMED:

Nome do médico assistente:

Códigos de procedimentos solicitados:

Segmento solicitado:

1. Tem limitações físicas das atividades de vida diária (AVD'S)?
() Sim () Não
2. Há quanto tempo apresenta limitações das AVD'S?

3. Fez tratamento conservador? () Sim () Não. Quais e por quanto tempo?

4. Tem hérnia discal? () Sim () Não
5. Tem sinais de estenose ou instabilidade cirúrgica? () Sim () Não
6. Tem cirurgia prévia no segmento a ser tratado? () Sim/Quais? () Não

7. Já realizou bloqueio anestésico facetário ou foraminal antes? Qual resultado? (% de melhora)

Dr (a). _____ Especialidade _____

CRM _____

São Paulo, ____ de ____ de 20__.

O procedimento tem indicação nos seguintes cenários:

1 – Dor Radicular Lombar:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

2- Claudicação Neurogênica:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

3- Dor Lombar Baixa, sem sintomas em membros inferiores apenas se:

- Atletas de alto rendimento durante o período de competição
- Grávidas com dor lombar que não respondem a outras formas de tratamento

Não mais que duas injeções na mesma sessão, 3 em 06 meses 6 em 1 ano. As duas injeções da mesma sessão podem ser bilaterais em um único nível ou, unilaterais em dois níveis.