

# Losartana Potássica

## **Indicação:**

É indicada para tratar pressão alta e insuficiência cardíaca. Pode ser usado também na prevenção do AVC e problemas de rins em resultado de diabetes tipo 2 ou para ajudar na recuperação após ataque cardíaco.

## **Posologia:**

De acordo com a prescrição médica.

## **Administração:**

A losartana pode ser tomada com ou sem alimentos, de preferência sempre no mesmo horário.

## **Efeitos colaterais:**

Os mais comuns são tontura, dor de cabeça, alteração dos batimentos cardíacos, dificuldade para respirar, cansaço, hipoglicemia e vertigens.

## **Contraindicações:**

Não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou durante a amamentação, assim como em crianças com menos de 18 anos. Procure orientação do seu médico.

## **Advertências e Precauções:**

Antes de se começar a tomar Losartana Potássica, deve-se informar o médico no caso de: inchaço de lábios, garganta ou língua; vômitos ou diarreia excessiva; bloqueio dos vasos sanguíneos que levam sangue ao rim; transplante recente do fígado; insuficiência cardíaca com ou sem insuficiência renal ou existir história de arritmias cardíacas; problemas nas válvulas do coração; doença coronária ou vascular cerebral; uso de outros medicamentos para controlar a pressão arterial.

## **Superdosagem:**

No caso de se tomar dose superior à indicada, podem surgir sintomas como pressão arterial baixa e aumento do batimento cardíaco, devendo-se procurar o médico prescritor.

# Losartana Potássica

## O que devo fazer quando esquecer de tomar esse medicamento?

Caso esse tempo seja superior há algumas horas, espere até a hora da dose seguinte e reinicie o uso do medicamento. É desaconselhado tomar dois comprimidos de uma vez para compensar a dose que foi esquecida. Faça acompanhamento pressórico nesse período.

## Interações medicamentosas:

O uso concomitante de Losartana Potássica e de agentes poupadores de potássio, suplementos de potássio e substitutos do sal que contenham potássio não é recomendado. Fluconazol, Rifampicina e os Anti-inflamatórios não-esteroidais como ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno e o naproxeno, podem diminuir a efetividade da losartana.

## Interações com Alimentos:

Na maioria das vezes, não há incompatibilidade do consumo da losartana com alimentos ou outros remédios. Apesar disso, o uso de álcool pode baixar ainda mais sua pressão.

## Losartana é diurético?

Não, embora Losartana tenha a mesma ação que os diuréticos na redução da pressão arterial, ele não aumenta a perda de líquidos através da urina.

