

# Pregabalina

## **Indicação:**

Este medicamento é indicado para o tratamento da dor neuropática, do transtorno de ansiedade generalizada e no controle da fibromialgia.

## **Posologia:**

De acordo com a prescrição médica. (Venda sob prescrição médica com retenção de receita– este medicamento pode causar dependência física ou psíquica) Portaria CI.

## **Administração:**

Pregabalina deve ser tomada com ou sem alimentos, antes ou após as refeições. Sendo que os intervalos diários e as doses são definidas pelo médico.

## **Efeitos colaterais:**

Os efeitos colaterais mais comuns são nasofaringite, aumento do apetite, humor eufórico, confusão, irritabilidade, depressão, desorientação, insônia, diminuição do desejo sexual, alterações na coordenação, tremores, amnésia, dificuldades de concentração, parestesia, sedação e alterações no equilíbrio.

## **Contraindicações:**

Este medicamento não deve ser usado em pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Além disso, grávidas, lactantes, diabéticos e idosos precisam consultar seu médico para avaliar se os efeitos colaterais compensam o uso do medicamento.

## **Advertências e Precauções:**

A pregabalina pode causar tontura e sonolência que podem prejudicar a habilidade de dirigir e operar máquinas, por isso, nestes casos, deve-se evitar dirigir ou operar máquinas durante o tratamento.

## **Superdosagem:**

Em caso de superdosagem, procurar imediatamente o seu médico.

# Pregabalina

## O que devo fazer quando esquecer de tomar esse medicamento?

Caso esqueça de tomar a cápsula no horário indicado, pode ingeri-la assim que lembrar. Mas, caso esteja próximo da dose seguinte, o ideal é esquecer a que já passou. Em hipótese alguma deve-se dobrar uma dose para compensar a que foi perdida.

## Interações medicamentosas:

Às vezes, a pregabalina pode interagir quimicamente com algumas substâncias: oxicodona (analgésico), bebidas alcoólicas, lorazepam (tranquilizante), medicamentos depressores do sistema nervoso central, como por exemplo midazolam e opiáceos.

## Interações com Alimentos:

A administração de pregabalina com alimentos não apresenta efeito clinicamente significativo sobre o grau de absorção deste medicamento.

## Pregabalina esta associada ao aumento de peso?

A pregabalina também pode causar aumento de peso, por isso, é provável que algumas pessoas engordem durante o tratamento.

