

Dorflex

Indicação:

Dorflex, comprimidos ou solução oral, é indicado para o alívio de dores de cabeça tensionais e de dores associadas a contraturas musculares em adultos.

Posologia:

Dorflex comprimidos: dose recomendada para adultos é de 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes por dia, nunca excedendo a dose máxima diária de 8 comprimidos. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem partir ou mastigar, com um copo de água e com ou sem alimentos.

Dorflex solução oral: A dose recomendada para adultos é de 30 a 60 gotas, 3 a 4 vezes por dia, nunca excedendo a dose máxima diária de 240 gotas.

Administração:

Como a absorção da medicação é variável e reduzida quando feita em conjunto com alimentos e até mesmo com outros medicamentos, o ideal é que seja tomada em jejum e que aguarde pelo menos trinta minutos para se alimentar ou tomar outros medicamentos.

Efeitos colaterais:

Alguns dos efeitos colaterais de Dorflex podem incluir secura na boca, redução ou aumento do ritmo cardíaco, batimentos irregulares do coração, palpitações, sede, diminuição do suor, dificuldade em urinar, visão embaçada, pupila dilatada, aumento da pressão dentro do olho, fraqueza, enjoo, vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, sonolência, coceira, alucinações, agitação, tremor, irritação no estômago com sintomas como dor no estômago e sensação de estômago cheio.

Contraindicações:

Dorflex está contraindicado para mulheres grávidas ou amamentando, crianças com menos de 12 anos de idade, pacientes com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, acalasia no esôfago, úlcera péptica estenosante, hipertrofia prostática ou obstrução do colo da bexiga, a pacientes com miastenia grave, doenças metabólicas como porfiria aguda do fígado intermitente ou deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase, a pacientes com função da medula óssea insuficiente, doenças do sistema hematopoiético ou com historial de reações alérgicas a analgésicos como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina e naproxeno e para pacientes com alergia aos derivados de pirazolonas ou a pirazolidinas ou a outros componentes da fórmula.

Dorflex

Advertências e Precauções:

Não deve ser utilizado para tratamento de rigidez muscular associada ao uso de antipsicóticos.

Superdosagem:

Em caso de administração excessiva de Dorflex, deve dirigir-se ao hospital mais próximo, levando a embalagem ou bula do medicamento. Alguns dos efeitos mais comuns que pode sentir após a toma excessiva de Dorflex podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, problemas no funcionamento dos rins, tontura, sonolência, coma, convulsões, queda da pressão sanguínea, alterações nos batimentos do coração ou coloração avermelhada na urina causada por excreção de Ácido Rubazônico.

O que devo fazer quando esquecer de tomar esse medicamento?

Caso ocorra o esquecimento da administração de uma dose de Dorflex deve tomar a dose esquecida logo que se lembre e ajustar o horário das doses seguintes. As doses de Dorflex nunca devem ser administradas em dobro ou em horários muito próximos.

Interações medicamentosas:

Dorflex não deve ser administrado em conjunto com alguns medicamentos ou substâncias sem orientação médica, como medicamentos contendo Propoxifeno ou Fenotiazínicos, como a Clorpromazina e álcool.