

TCI* - COLETA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO

TCI -TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

ATENDIMENTO:
PACIENTE:
DATA DE NASCIMENTO:
FILIAÇÃO:
DATA:

Eu acima citada através da indicação do Dr. (a) , CRM: e por sua referência, solicito a realização da coleta para análise celular do concepto que estou gerando. Para tanto, entendo que será necessária à coleta de células fetais presentes no líquido amniótico que será obtida através de punção transabdominal com utilização de uma agulha hipodérmica a ser realizada pelo Dr. (a): , CRM .

O exame de líquido amniótico é um exame pré-natal que consiste na punção e estudo cromossômico das células amnióticas, cujas características genéticas são iguais ao do feto e é usado para pesquisa de contaminação fetal por infecções. Pode ser realizado a partir da 14ª semana de gestação.

As principais indicações são: 1. Idade materna avançada (acima de 35 anos) / 2. Anormalidade fetal na gravidez (alteração no ultrassom) / 4. Translocação cromossômica no casal, / 5. Gestação anterior com doença genética / 6. Óbito fetal na gravidez atual / 7. História de perdas fetais / 8. Ansiedade materna / 9. Pesquisa de paternidade e infecções.

Contudo, entendi e aceitei as seguintes implicações abaixo explanadas:

1. Que a amniocentese transabdominal é uma técnica usual que tem sido largamente empregada, e embora possa haver algum risco nesse procedimento, seja para o feto, seja para mim, tal risco é considerado extremamente pequeno, de acordo com as citações da literatura pertinente. O risco materno é praticamente zero e o risco de o procedimento provocar o abortamento é em torno de 1-2 para mil. Nessa fase, superior a 14 semanas, o risco de aborto espontâneo é em torno de 20 para mil.
2. Que às vezes, a punção pode não resultar em coleta de líquido amniótico.
3. Que pode não haver sucesso no cultivo das células, ou que a preparação citogenética não seja satisfatória para uma conclusão definitiva, havendo necessidade de nova punção, isto ocorre em cerca de 1% dos casos.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Recomenda-se a administração de imunoglobulina anti-Rh dentro de 24 horas da coleta em paciente com grupo sanguíneo Rh.
- O risco de sérias complicações, incluindo perda fetal, varia nos diferentes centros de 0,2% a 0,5%.

- Antes de realizar a punção é necessário realizar um minucioso ultrassom para avaliação do feto. Este minucioso exame tem a intenção de detectar qualquer anormalidade fetal prévia à amniocentese. O mais importante é realmente a monitorização de modo a dar a certeza do caminho a ser percorrido pela agulha.

DADOS DA COLETA

Médico que coletou: Data da coleta:

DUM: Idade gestacional: semanas Gest.: Partos: Perdas:

1ª Ser.: mL 2ª Ser.: mL 3ª Ser.: Soma dos volumes das seringas: mL

Quantidade de seringas: Puncionadas nesta ordem: [] Sim [] Não

Seringas identificadas: [] Sim [] Não

Amostra: [] clara [] pouco sangue [] muito sangue [] meconial

INDICAÇÃO DO EXAME:

DECLARAÇÃO

Desse modo, de forma espontânea, permito que seja realizado em mim tal exame eximindo, em qualquer tempo, os médicos acima enunciados, de qualquer culpabilidade no eventual surgimento de complicações materna ou fetal futuras, assumindo integralmente os riscos que atesto ter conhecimento. Assim sendo, declaro que li, tive conhecimentos e aceitei as implicações explanadas neste termo de consentimento.

Franca, de de .

Assinatura do Paciente	Assinatura do Responsável

Assinatura do Médico executante
CRM <input type="text"/>