

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Orais Administrados via Sonda Enteral

Apresentação Comercial	Princípio Ativo	Pode ser administrado via sonda?		Recomendações
		Sim	Não	
Diamox cp	ACETAZOLAMIDA 250MG VO	X		
Zovirax cp	ACICLOVIR 200MG VO	X		
Aspirina Infantil	ACIDO ACETIL SALICILICO	X		
Aspirina Prevent cp	ACIDO ACETIL SALICILICO		X	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo e favorecer a irritação da mucosa gástrica.
Cewin cp	ACIDO ASCORBICO 500MG VO		X	Os comprimidos são de liberação prolongada e possuem hidroxipropilmetilcelulose (quando misturada em água confere viscosidade) e ácido ascórbico (pode sofrer degradação na presença de umidade) em sua composição, ocasionando risco de obstrução da sonda. Alternativa. Redoxon gotas.
Endofolin cp	ACIDO FOLICO 5MG VO	X		Alternativa: endofolin gts ou solução
Transamin cp	ACIDO TRANEXAMICO 250MG VO	X		
Depakene cáp.	ACIDO VALPROICO 250MG VO	X		Pode ocorrer irritação no TGI.
Zyloric cp	ALOPURINOL 100MG VO	X		
Frontal cp	ALPRAZOLAM 0,5MG VO	X		
Aminofilina	AMINOFILINA 200MG VO	x		
Atlansil cp Ancoron	AMIODARONA 200MG VO		X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: gotas, ampola.
Tryptanol cp	AMITRIPTILINA 25MG VO	X		
Amoxil cap	AMOXACILINA 500MG VO		x	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: Suspensão.
Norvasc cp	ANLODIPINA 5MG /10MG VO	X		
Atenolol	ATENOLOL 50MG VO		X	Princípio ativo parcialmente solúvel em água.
Lipitor	ATORVASTATINA 10mg/20mg/40 mg vo	X		
Akineton	BIPERIDENO 2MG VO	X		

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Oraís Administrados via Sonda Enteral

Dulcolax dg	BISACODIL 5MG VO	X	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo. Alternativa: Dulcolax gotas.
Lexotan cp	BROMAZEPAM 3MG VO	X	Alternativa: Lexotan gotas.
Digesan cap.	BROMOPRIDA 10MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: Digesan Gotas.
Capoten	CAPTOPRIL 12,5 MG / 25MG VO	X	
Tegretol cp	CARBAMAZEPINA 200MG VO	X	Alternativa: tegretol xarope. Estudos mostram que há adsorção da carbamazepina quando administrado via sonda na forma de xarope. Para evitar perda da eficácia propõe-se a diluição em volume igual de água antes da administração.
Os-cal D cp	CARBONATO DE CALCIO	X	Alto risco de obstrução da sonda.
Coreg cp	CARVEDILOL 12,5MG /25MG/3,125MG/6,25MG VO	X	
Keflex dg	CEFALEXINA 500MG VO	X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Alternativa: Keflex Suspensão
Cebralat cp	CILOSTAZOL 100MG	X	
Cipramil	Citalopram	X	
Stugeron	CINARIZINA 75MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Cipro cp	CIPROFLOXACINO 500MG VO	X	A administração de cipro e dieta enteral podem acarretar a diminuição da absorção do fármaco. Recomenda-se pausar a dieta enteral 1 hora antes e 1 hora depois da administração.
Klaricid cp	CLARITROMICINA 500MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: Klaricid suspensão.
Dalacin cp	CLINDAMICINA 300MG VO	X	A cápsula pode ser aberta e o conteúdo diluído em água. Pode ocorrer irritação e danos ao TGI.
Rivotril sl	CLONAZEPAM 0,25MG SUBLINGUAL	X	O Laboratório não orienta a troca da via de administração do medicamento, pois o mesmo poderá sofrer mudanças em suas características.
Rivotril cp	CLONAZEPAM 0,5MG / 2MG VO	X	Alternativo: Rivotril Gotas.
Atensina	CLONIDINA 100MCG /200MCG VO	X	
Plavix cp	CLOPIDOGREL 75MG VO	X	

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Oraís Administrados via Sonda Enteral

Quemisetina dg	CLORANFENICOL 500MG VO	X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Alternativa: Quemisetina xarope.
Amplictil	CLORPROMAZINA 100MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Higroton cp	CLORTALIDONA 12,5MG /50MG VO	X	
Tylen cp	CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG	X	
Beneroc dg	COMPLEXO B VO	X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Alternativa: gotas
Pradaxa	DABIGATRANA	X	Não é indicada a administração dessa forma, pois pode aumentar a biodisponibilidade do medicamento.
Decadron cp	DEXAMETASONA 4MG VO	X	Alternativa: Decadron Elixir.
Valium cp	DIAZEPAM 10MG/ 5MG VO	X	
Voltaren cp	DICLOFENACO SODICO 50MG VO	X	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo e /ou favorecer a irritação da mucosa gástrica.
Digoxina cp	DIGOXINA 0,25MG VO	X	Alternativa:Elixir.
Cardizem cp	DILTIAZEM 30MG/ 60MG VO	X	
Luftal cp	DIMETICONA 40MG VO	X	Alternativa: Luftal gotas
Renitec cp	ENALAPRIL 20MG VO	X	
Buscopan dg	ESCOPOLAMINA 10MG VO	X	Alternativa:gotas
Aldactone	ESPIRONOLACTONA 100MG/ 25MG	x	
Hidantal cp	FENITOINA 100MG VO	X	Monitorar o nível sérico, pois a administração de fenitoína e dieta enteral pode acarretar a diminuição da absorção do fármaco. Recomenda-se pausar a dieta enteral 1 hora antes e 2 horas depois da administração. Alternativa: Epelin solução
Gardenal cp	FENOBARBITAL 100MG VO	x	Alternativa: Gardenal gotas
Zoltec cáps.	FLUCONAZOL 150MG VO	X	Abri a cápsula e aguardar a dissolução dos grânulos, não macerar. Administrar após completa solubilização.
Flunarin cap	FLUNARIZINA 10MG VO	X	Medicamento possui excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados e solubilizados.

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Orais Administrados via Sonda Enteral

Prozac cáp.	FLUOXETINA 20MG VO	X	A cápsula pode ser aberta e o conteúdo dissolvido em água, imediatamente antes da administração. Alternativa: Daforin gotas.
Lasix cp	FUROSEMIDA 40MG VO	X	Alternativa: Solução extemporânea furosemida 1 mg/ml
Daonil cp	GLIBENCLAMIDA 5MG VO	X	
Amaryl	GLIMEPIRIDA 2MG VO	X	Os comprimidos são sulcados e podem ser partidos ao meio, mas não devem ser macerados, conforme orientação do fabricante.
Haldol cp	HALOPERIDOL 5MG VO	X	Alternativa: Haldol gotas
Moduretic cp	HIDROCLOROTIAZIDA + AMILORIDA 50MG VO	X	
Iguassina	HIDROCLOROTIAZIDA + TRIANTERENO VO	X	Permite partição, porém não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Clorana cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/50MG VO	x	
Tofranil dg	IMIPRAMINA 25MG VO	X	
Isocordil SL cp	ISOSSORBIDA DINITRATO SUBLINGUAL 5MG VO	X	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do fármaco.
Monocordil cp	ISOSSORBIDA MONONITRATO-5 20MG VO	X	
Levaquin cp	LEVOFLAXACINO	X	A administração de levofloxacino e dieta enteral pode acarretar a diminuição da absorção do fármaco. Recomenda-se pausar a dieta enteral
Imosec cp	LOPERAMIDA 2MG VO	X	
Claritin cp	LORATADINA 10MG VO	X	Alternativa: Claritin Xarope.
Lorax	LORAZEPAM 2MG VO	X	
Cozzar cp	LOSARTAN 50MG VO	X	
Glucoformin cp	METFORMINA 850MG VO	X	Existe risco de obstrução em sondas de calibre fino.
Aldomet	METILDOPA 500MG VO	x	
Tapazol cp	METIMAZOL 5MG (TIAMAZOL)	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Plasil cp	METOCLOPRAMIDA 10MG VO	X	Alternativa: Plasil gotas.
Flagyl cp	METRONIDAZOL 400MG VO	X	Alternativa: Flagyl solução

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Orais Administrados via Sonda Enteral

Dormonid cp	MIDAZOLAM 15MG VO	X	Alternativa: Domire solução.
Dimorf cp	MORFINA 10MG/30MG VO	X	
Avalox	MOXIFLOXACINO 400MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Adalat Oros	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO VO	X	Não deve ser triturado , pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade, manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, além do risco de obstrução da sonda.
Adalat Retard	NIFEDIPINA 10MG /20MG RETARD VO	X	Não deve ser triturado , pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade, manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, além do risco de obstrução da sonda.
Scaflan	NIMESULIDA 100MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: gotas
Nimotop cp	NIMODIPINA 30MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Losec Mulp cp	OMEPRAZOL 20MG VO	X	Não macerar. O comprimido deve ser disperso em água e a solução obtida deve ser administrada em até 30 minutos.
Dorflex	ORFENADRINA + CAFEINA + DIPIRONA VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.
Tamiflu cáp	OSELTAMIVIR 75MG	X	
Tylenol cp	PARACETAMOL 750MG VO	X	Alternativa: Tylenol gotas.
Pentox cp	PENTOXIFILINA 400MG VO	X	O comprimido possui núcleo que impede a liberação imediata do medicamento, causando alteração na eficácia.
Permanganato de potássio	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	X	É para uso em dermatites e exsudativas, como adstringente bactericida. Seu modo de uso é diluir o comprimido no momento do uso, em um a quatro litros de água e usar na forma de compressas ou no banho, ou a critério médico. Conforme descrito na sua cartela o produto é destinado somente para uso externo (uso tópico).
Meticorten cp	PREDNISONA 5MG /20MG VO	X	
Fenergan cp	PROMETAZINA 25MG VO	x	Alternativa: ampola
Inderal cp	PROPRANOLOL 40MG/ 80MG VO	X	
Ritmonorm	PROPAFENONA 300MG VO	X	

Farmácia
Tabela de Estabilidade de Medicamentos Sólidos Oraís Administrados via Sonda Enteral

Antak cp	RANITIDINA 150MG VO	X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Alternativa:suspensão.
Rifaldin cáp.	RIFAMPICINA 300MG VO	X	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. Alternativa: Rifaldin suspensão.
Risperdal cp	RISPERIDONA 2MG VO	X	Alternativa: Risperdal solução.
Floratil cap	SACCHAROMYCES BULARDI LIOF 100MG VO	X	A cápsula pode se aberta e o conteúdo dissolvido em água.
Bactrim cp Bactrim F	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG VO	X	O princípio ativo e os excipientes quando macerados podem causar obstrução da sonda. Alternativa. Suspensão.
Synthroid	TIROXINA 25MCG/ 100 MCG	X	Comprova-se somente a estabilidade do medicamento com a administração via oral, porém abre a possibilidade de macerar os comprimidos e administrar via oral para crianças.
Topamax cp	TOPIRAMATO 25MG	X	
Tramal cáp	TRAMADOL	X	Alternativa: Tramal gotas, ampola.
Diovan cp	VALSARTAN 160MG / 320MG / 80MG VO	X	
Coumadin cp	VARFARINA SODICA 5MG VO	X	A dieta enteral pode causar redução na concentração de varfarina, é necessário o acompanhamento do nível sérico.
Dilacoron / vasoton cp	VERAPAMIL 80MG VO	X	