

PROTOCOLO PARA BLOQUEIOS / DENERVAÇÃO /  
RIZOTOMIA PERCUTÂNEA EM COLUNA

Dr. Gumericino P. Faria Filho  
Diretor Técnico Médico  
CRM - RJ 5246804-6

**Unimed**   
Costa do Sol

www.unimed.coop.br/costadosol  
Rua Euzébio de Queiroz, 454  
27910-230 Centro, Macaé - RJ  
T.(22) 2105-8000

**DADOS DO PACIENTE**

Nome: \_\_\_\_\_

Nº carteira Unimed: \_\_\_\_\_ Nome do médico assistente: \_\_\_\_\_

Códigos de procedimentos solicitados: \_\_\_\_\_

Segmento solicitado: \_\_\_\_\_

1. Tem limitações físicas das atividades de vida diária (AVD'S)?  Sim  Não

2. Há quanto tempo apresenta limitações das AVD'S? \_\_\_\_\_

3. Fez tratamento conservador?  Sim  Não. Quais e por quanto tempo?

4. Tem hérnia discal?  Sim  Não

5. Tem sinais de estenose ou instabilidade cirúrgica?  Sim  Não

6. Tem cirurgia prévia no segmento a ser tratado?  Não  Sim/Quais?

7. Já realizou bloqueio anestésico facetário ou foraminal antes? Qual resultado? (% de melhora)

Dr (a). \_\_\_\_\_

Especialidade: \_\_\_\_\_

CRM \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

# PROTOCOLO PARA BLOQUEIOS / DENERVAÇÃO / RIZOTOMIA PERCUTÂNEA EM COLUNA

Dr. Gumericino P. Faria Filho  
Diretor Técnico Médico  
CRM - RJ 5246804-6

**Unimed**   
Costa do Sol

[www.unimed.coop.br/costadosol](http://www.unimed.coop.br/costadosol)  
Rua Euzébio de Queiroz, 454  
27910-230 Centro, Macaé - RJ  
T.(22) 2105-8000

## O PROCEDIMENTO TEM INDICAÇÃO NOS SEGUINTE CENÁRIOS:

### 1 - Dor Radicular Lombar:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

### 2- Claudicação Neurogênica:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

### 3- Dor Lombar Baixa, sem sintomas em membros inferiores apenas se:

- Atletas de alto rendimento durante o período de competição
- Grávidas com dor lombar que não respondem a outras formas de tratamento

Não mais que duas injeções na mesma sessão, 3 em 06 meses 6 em 1 ano. As duas injeções da mesma sessão podem ser bilaterais em um único nível ou, unilaterais em dois níveis.