

DOSAGEM DE GORDURA POR MICROMÉTODO NAS FEZES ESTEATÓCRITO

INTERFERENTES NO EXAME

- **NÃO** colher o material do vaso sanitário;
- **NÃO** “contaminar” o material com urina;
- **NÃO** usar pomada na região anal nas 24 horas que antecedem a coleta das fezes;
- **NÃO** usar laxativos ou supositórios nas 48 horas que antecedem o exame;
- Caso o cliente tenha realizado colonoscopia, a coleta de fezes deve ser realizada pelo menos 72 horas após o procedimento;
- Após o uso de contrastes radiológicos via oral deve-se aguardar no mínimo 3 dias.

COMO COLHER O MATERIAL



1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem “contaminar” com urina;



2. Embalar o recipiente no zip e na sacola plástica.

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar as fezes da fralda imediatamente após a evacuação e colocar no frasco.
- **FEZES LÍQUIDAS:** Coletar as fezes com saco coletor colocado em região perianal e entregar no saco coletor fechado.

ENTREGA DO MATERIAL

- A entrega do material pode ser feita em qualquer Unidade de Atendimento.
- O material deve ser entregue em até 2 horas em temperatura ambiente ou 12 horas se mantido refrigerado (2 A 8° C)

FRASCOS ENTREGUES

- ☐ Frasco grande seco

Assinatura do Colaborador: _____

Data: ____/____/____