


HELICOBACTER PYLORI - PESQUISA NAS FEZES

INTERFERENTES NO EXAME

- **NÃO** colher o material do vaso sanitário;
- **NÃO** utilizar laxantes e/ou supositório;
- **NÃO** “contaminar” o material com urina;
- **NÃO** usar pomada na região anal **24h** antes da coleta;
- **NÃO** utilizar antibiótico via oral **30 dias** antes da coleta;
- **NÃO** utilizar antibióticos **30 dias** antes da coleta;
- **NÃO** utilizar inibidor de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, etc) ou composto bismuto (bisogel, magnésia bisurada, etc) **15 dias** antes da coleta.
- Caso o cliente tenha realizado colonoscopia, a coleta de fezes deve ser realizada pelo menos **7 dias** após o procedimento;
- Mulheres não devem fazer a coleta durante a menstruação. Se isso não for possível, é preciso colocar tampão vaginal antes de evacuar;
- Após o uso de contrastes radiológicos via oral deve-se aguardar no mínimo **72 horas**.

COMO COLHER O MATERIAL



1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem “contaminar” com urina;
2. Embalar o recipiente no zip e na sacola plástica.

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar as fezes da fralda imediatamente após a evacuação e colocar no frasco.
- **FEZES LÍQUIDAS:** Coletar as fezes com saco coletor colocado em região perianal e entregar no saco coletor fechado, dentro do frasco.

ENTREGA DO MATERIAL

- Informar-se sobre a unidade de atendimento e horário para a entrega do material.
- O material deve ser entregue em até 48 horas se mantido refrigerado (2 A 8° C).

FRASCOS ENTREGUES

- ☐ Frasco grande seco

Assinatura do Colaborador: _____

Data: ____/____/____