


EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES

INTERFERENTES DO EXAME:

- **NÃO** colher o material do vaso sanitário;
- **NÃO** "contaminar" o material com urina;
- Não utilizar laxantes que contenham óleo mineral ou hidróxido de magnésio durante as 48 horas que antecedem a coleta. Pacientes com constipação crônica podem utilizar o laxante Tamarine
- Caso tenha utilizado contraste radiológico via oral, o exame parasitológico só poderá ser realizado após 72 horas;
- Caso observe algum verme nas fezes, favor separá-lo em outro frasco limpo e adicionar água (NÃO adicionar álcool).



5. Anotar no rótulo do frasco:

- nome do paciente;
- data e hora da coleta das fezes.

6. Colocar no zip, na sacola e entregar na unidade.


QUANDO SOLICITADA MAIS DE UMA AMOSTRA:

- O intervalo mínimo sugerido entre as coletas é de dois dias ou a critério do seu médico.


COMO COLHER O MATERIAL




1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem "contaminar" com urina.



2. Abrir o frasco com conservante com cuidado para não derramar o líquido.



3. Com a colher, preencher o coletor do frasco.



4. Tampar. Agitar o frasco com conservante para que se dissolva a amostra.

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar as fezes da fralda imediatamente após a evacuação. Colocar no frasco contendo fixador e no frasco grande, seguindo as instruções a partir da segunda ilustração ao lado.

- **FEZES LIQUIDAS:** Coletar as fezes com saco coletor colocado em região perianal e transferir para o frasco com conservante o volume de 1 colher de fezes

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Entregar, se possível, as três amostras juntas
Devido à presença de conservante, não é necessário armazená-las em geladeira.
A amostra coletada possui estabilidade de até 10 dias.