

PESQUISA DE GORDURA NAS FEZES

INTERFERENTES NO EXAME

- Não coletar se houver diarreia líquida;
- Após o uso de contraste radiológico por via oral, é necessário aguardar 72 horas para realizar a coleta;
- Não tomar leite de magnésia nem laxantes com óleo mineral ou hidróxido de magnésio nas 48 horas que antecedem a coleta;
- O cliente não deve usar pomadas na região anal nas 24 horas que antecedem a coletada das fezes.

COMO COLHER O MATERIAL



1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem “contaminar” com urina;



2. A quantidade mínima de fezes necessária para a realização do exame é equivalente a uma semente de ervilha (100mg);

3. Identificar com nome, data e horário da coleta;



4. Embalar o recipiente no zip e na sacola plástica.

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar as fezes da fralda imediatamente após a evacuação e colocar no frasco.
- **FEZES DIARREICAS:** Coletar as fezes com saco coletor colocado em região perianal e entregar no saco coletor fechado.

ENTREGA DO MATERIAL

- A entrega do material pode ser feita em qualquer Unidade de Atendimento.
- Entregar em até 3 horas, se a amostra for mantida em temperatura ambiente, ou em até 12 horas, se ficar refrigerada (2 A 8° C).

FRASCOS ENTREGUES

- ☐ Frasco grande seco

Assinatura do Colaborador: _____

Data: ____/____/____