Dica: Ao abrir este PDF, pressione, simultaneamente, as teclas **Ctrl + F.** Uma caixa de pesquisa aparecerá. Digite o nome do exame que você deseja encontrar e aperte a tecla enter.

Exigência de jejum para a realização de exames.

Sumário

Jejum não obrigatório..... Pág 2

Jejum obrigatório..... Pág 5

Jejum desejável..... Pág 7

Outros / Recomendações para exames em criança..... Pág 8

Unimed Três Vales

Conheça o nosso laboratório e comprove a qualidade do serviço Unimed.

Laboratório Unidade Centro
Atendimento : **Segunda a Sexta das 6h às 18h. Sábado das 6h às 12h.**
Rua Dr. Manoel Esteves, 351 - Centro
Teófilo Otoni - MG - Cep: 39800-090

Laboratório Unidade Pronto Atendimento
Atendimento : **Todos os dias da semana das 6h30 às 18h.**
Rua Detsi Gazzinelli, 255 - Castro Pires
Teófilo Otoni - MG - Cep: 39801-604

T. (33) 3529-1100

Agendamentos para a coleta domiciliar, através do WhatsApp (33) 3529-1100

Jejum não obrigatório

EXAME	TEMPO DE JEJUM
ACIDO FOLICO	Jejum não obrigatório.
ACIDO LATICO	Jejum não obrigatório.
ACIDO URICO	Jejum não obrigatório.
ACIDO VALPROICO	Jejum não obrigatório.
ALBUMINA	Jejum não obrigatório.
AMILASE	Jejum não obrigatório.
ANTIESTREPTOLISINA O - ASLO	Jejum não obrigatório.
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO, CEA	Jejum não obrigatório.
APOLIPOPROTEINA A1	Jejum não obrigatório.
APOLIPOPROTEINA E	Jejum não obrigatório.
BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICORPOS IgM	Jejum não obrigatório
CALCIO IONICO	Jejum não obrigatório.
CALCIO, SÉRICO	Jejum não obrigatório.
CARIOTIPO BANDA G	Jejum não obrigatorio.
CATECOLAMINAS URINARIAS	Jejum não obrigatório. Dieta especial antes do dia da coleta.
CHIKUNGUNYA	Jejum não obrigatório.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG	Jejum não obrigatório
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM	Jejum não obrigatório.
CHUMBO	Jejum não obrigatório.
CITOMEGALOVIRUS IgG	Jejum não obrigatório, porém amostras com lipemia acentuada podem interferir na realização do exame. Recoleta para confirmação de resultado será necessária nestas situações
CITOMEGALOVIRUS IGM	Jejum não obrigatório, porém amostras com lipemia acentuada podem interferir na realização do exame. Recoleta para confirmação de resultado será necessária nestas situações
CLEARENCE DE CREATININA	Jejum não obrigatório.
CLORO	Jejum não obrigatório.
COLESTEROL HDL	Jejum não obrigatório.
COLESTEROL TOTAL	Jejum não obrigatório.
COMPLEMENTO CH-100	Jejum não obrigatório.
COMPLEMENTO CH-50	Jejum não obrigatório.
COMPLEMENTO SERICO C3	Jejum não obrigatório.
COMPLEMENTO SERICO C4	Jejum não obrigatório.
COOMBS DIRETO	Jejum não obrigatório.
COOMBS INDIRETO	Jejum não obrigatório.
CORTISOL (06:00 Hr)	Jejum não obrigatório.
CORTISOL LIVRE - URINA 24 HS	Jejum não obrigatório.
CREATININA	Jejum não obrigatório.

CREATINOFOSFOQUINASE CPK	Jejum não obrigatório.
CREATINOFOSFOQUINASE MB MASSA	Jejum não obrigatório.
DEHIDROGENASE LATICA - LDH	Jejum não obrigatório.
DENGUE IGG	Jejum não obrigatório.
DENGUE IGM	Jejum não obrigatório.
DIMERO D	Jejum não obrigatório.
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	Jejum não obrigatório.
ENDOMISIO IgA, ANTICORPOS ANTI	Jejum não obrigatório.
ENDOMISIO IGG, ANTIC. ANTI	Jejum não obrigatório.
ENDOMISIO IGM, ANTIC. ANTI	Jejum não obrigatório.
ESTRADIOL	Jejum não obrigatório.
FATOR ANTI NUCLEAR (FAN) HEP2	Jejum não obrigatório.
FERRITINA SERICA	Jejum não obrigatório.
FOSFATASE ALCALINA	Jejum não obrigatório.
FOSFORO	Jejum não obrigatório.
GAMA GT	Jejum não obrigatório.
GASOMETRIA ARTERIAL	Jejum não obrigatório.
GASOMETRIA VENOSA	Jejum não obrigatório.
GLOBULINA LIGADORA DE TIROXINA - TBG	Jejum não obrigatório.
GLOBULINA LIGADORA HORMONIOS SEXUAIS	Jejum não obrigatório.
GRUPO SANGUINEO + FATOR RH	Jejum não obrigatório.
H.C.G-GONADOTROFINA CORIONICA	Jejum não obrigatório.
HAV IgG, ANTI	Jejum não obrigatório.
HAV IgM, ANTI	Jejum não obrigatório.
HBC IgG, ANTI	Jejum não obrigatório.
HBC IgM, ANTI	Jejum não obrigatório.
HBC TOTAL, ANTI	Jejum não obrigatório.
HBE, ANTI	Jejum não obrigatório.
HBs Ag - ANTIGENO AUSTRALIA	Jejum não obrigatório.
HBS, ANTI	Jejum não obrigatório.
HCV, ANTI	Jejum não obrigatório.
HEMOGLOBINA GLICADA-A1C	Jejum não obrigatório.
HIV 1 E 2, ANTIC. ANTI	Jejum não obrigatório.
HOMOCISTEINA TOTAL	Jejum não obrigatório.
HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE	Jejum não obrigatório.
HORMONIO LUTEINIZANTE	Jejum não obrigatório.
HTLV I E II ANTICORPOS ANTI - PESQUISA	Jejum não obrigatório.
IgE TOTAL	Jejum não obrigatório.
IMUNOGLOBULINA A - IgA	Jejum não obrigatório.
IMUNOGLOBULINA G - IgG / SANGUE	Jejum não obrigatório.
IMUNOGLOBULINA M - IgM / SANGUE	Jejum não obrigatório.
LATEX FATOR REUMATOIDE	Jejum não obrigatório.
LIPASE	Jejum não obrigatório.
MAGNESIO	Jejum não obrigatório.
MUCOPROTEINAS	Jejum não obrigatório.

PARATORMONIO PTH INTACTO	Jejum não obrigatório.
PEPTIDEO C	Jejum não obrigatório.
PSA LIVRE/PSA TOTAL	Jejum não obrigatório.
PSA, ANTIGENO PROSTATICO -	Jejum não obrigatório.
RUBEOLA - IgG	Jejum não obrigatório, porém amostras com lipemia acentuada podem interferir na realização do exame. Recoleta para confirmação de resultado será necessária nestas situações.
RUBEOLA - IgM	Jejum não obrigatório, porém amostras com lipemia acentuada podem interferir na realização do exame. Recoleta para confirmação de resultado será necessária nestas situações.
SANGUE OCULTO, PESQUISA	Jejum não obrigatório - Evitar o uso de laxantes, contraste oral
SIFILIS - FTA-ABS-IgG	Jejum não obrigatório.
SIFILIS - FTA-ABS-IgM	Jejum não obrigatório.
SODIO - NA+	Jejum não obrigatório.
SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA	Jejum não obrigatório.
T3 LIVRE	Jejum não obrigatório.
T3 TOTAL	Jejum não obrigatório.
T4 LIVRE	Jejum não obrigatório.
T4 TOTAL	Jejum não obrigatório.
TESTOSTERONA LIVRE	Jejum não obrigatório.
TESTOSTERONA TOTAL	Jejum não obrigatório.
TIREOGLOBULINA	Jejum não obrigatório.
TOXOPLASMOSE IgG	Jejum não obrigatório.
TOXOPLASMOSE IgM	Jejum não obrigatório.
TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO	Jejum não obrigatório.
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	Jejum não obrigatório.
TRIGLICERIDEOS	Jejum não obrigatório, de acordo com o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico".
TSH, HORMONIO TIROESTIMULANTE	Jejum não obrigatório.
UREIA	Jejum não obrigatório.
VITAMINA B12	Jejum não obrigatório.
VITAMINA D 25 HIDROXI, DOSAGEM (VITAMINA D3)	Jejum não obrigatório.

Jejum obrigatório

EXAME	TEMPO DE JEJUM
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	Jejum obrigatório de 8 horas ou a critério médico.
ANTICOAGULANTE LUPICO - FOSFOLIPEDES HEXAGONAL	Jejum obrigatório de 8 horas.
ANTICORPOS ANTI MIELOPEROXIDASE	Jejum obrigatorio de 8 horas - - Intervalo entre mamadas para lactentes.
APOLIPOPROTEINA B	Jejum obrigatório de 12 horas - Intervalo entre mamadas para lactentes.
CAP.TOTAL DE COMB. FERRO	Adultos: Jejum obrigatório de 8 horas - Crianças: Jejum obrigatório de 4 horas.
CARDIOLIPINA IgA	Jejum obrigatório de 8 horas.
CARDIOLIPINA IGG, AUTO	Jejum obrigatório de 8 horas.
CARDIOLIPINA IGM, AUTO	Jejum obrigatório de 8 horas.
CATECOLAMINAS SANGUE	Jejum obrigatório de 8 horas.
COMPLEMENTO C1Q	Jejum obrigatório de 8 horas.
CRESCIMENTO, HORMÔNIO DO (HGH)	Jejum obrigatório de 8 horas ou conforme orientação médica.
CURVA GLICEMICA DE 3 HORAS	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme pedido médico - Em caso de crianças, seguir orientação médica.
FERRO SERICO	Jejum obrigatório de 8 horas.
GLICOSE	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
GLICOSE POS PRANDIAL 2H	Jejum obrigatório de 2 horas após refeição ou conforme orientação médica.
GLICOSE 1 HORA APÓS DEXTROSOL	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
GLICOSE 2 HORAS APÓS DEXTROSOL	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
GLICOSE 30 MINUTOS APÓS DEXTROSOL	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
GLICOSE 90 MINUTOS APÓS DEXTROSOL	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
INDICE DE SAT. TRANSFERRINA	Jejum obrigatório de 8 horas.
INSULINA	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
INSULINA 2 HORAS APÓS REFEIÇÃO	Jejum obrigatório de 2 horas após refeição.
INSULINA, AUTO ANTICORPOS ANTI	Jejum obrigatório de 8 a 14 horas ou conforme orientação médica.
NEUTROFILOS, ANCA P	Jejum obrigatório de 8 horas.
NEUTROFILOS, ANTI ANCA C E P	Jejum obrigatório de 8 horas.
RNP, AUTO ANTICORPOS ANTI	Jejum obrigatório de 8 horas.
SCHISTOSSOMOSE RFC/IFI	Jejum obrigatório de 8 horas.
SEROTONINA PLASMATICA	Jejum obrigatório de 8 horas.
SSA/RO, AUTO ANTICORPOS ANTI	Jejum obrigatório de 8 horas.

SSB-LA, AUTO ANTICORPOS ANTI	Jejum obrigatório de 8 horas.
T3 REVERSO	Jejum obrigatório de 4 horas.
TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA, ANTICORPOS ANTI	Jejum obrigatório de 8 horas.
V D R L	Jejum obrigatório de 8 horas - Intervalo entre mamadas para lactentes.
VITAMINA A	Jejum obrigatório de 8 horas.
VITAMINA B1 - TIAMINA	Jejum obrigatório de 8 horas.
VITAMINA B6	Jejum obrigatório de 8 horas.
VITAMINA C	Jejum obrigatório de 8 horas.
VITAMINA E	Jejum obrigatório 8 horas.

Jejum desejável

EXAME	TEMPO DE JEJUM
CARBAMAZEPINA	Jejum alimentar desejável de 4 horas ou conforme orientação médica - Intervalo entre mamadas para lactentes
COAGULOGRAMA	Jejum desejável de 4 horas.
ERITROGRAMA	Jejum desejável de 4 horas.
FIBRINOGENIO	Jejum desejável de 4 horas.
GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI	Jejum desejável de 4 horas.
HEMOGRAMA COMPLETO	Jejum desejável de 4 horas.
IGFBP3	Jejum desejável de 4 horas.
LEPTINA	Jejum desejável de 4 horas.
TEMPO DE PROTROMBINA	Jejum desejável de 4 horas.
TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL	Jejum desejável de 4 horas.
TESTE RAPIDO STREPTOCOCCUS A	Jejum desejável de pelo menos duas horas (para se evitar vômitos).

Outros

EXAME	TEMPO DE JEJUM
URINA CULTURA	Fazer higiene na genitália com água e sabão, secar , desprezar o 1° jato urinário e coletar o jato médio. Não é recomendável a coleta domiciliar, caso não seja possível ir ao laboratório, entregar a urina no prazo máximo de 1 hora após micção.
URINA ROTINA	Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo mínimo de 4 horas entre as micções.

Recomendações para exames em crianças:

Habitualmente, recomenda-se um jejum de 3 a 4 horas; entretanto, em lactentes, este prazo poderá ser de 1 a 3 horas, ou seja, o intervalo entre uma mamada e outra ou conforme orientação médica.

Em crianças acima dos 5 anos de idade, o jejum recomendado para realização de exames laboratoriais é igual ao recomendado para os adultos.

ANS - Nº 316881

Laboratório Unimed

CNPJ: 66.343.559/0003-94

Responsável Técnico

Dr. Fabrício Nacif Ribeiro CRM 33422

Unimed

Três Vales