



# Orientações de Uso de Medicamentos

*Bem vindo(a) ao programa de Assistência Farmacêutica Unimed Conselheiro Lafaiete!*

*A partir de agora você contará com todo o suporte e apoio do grupo de nossas Farmacêuticas, para poder dar informações e tirar suas dúvidas e sobre seu medicamento.*

*Nós elaboramos esse material com as principais informações sobre o tratamento com o medicamento ALFAEPOETINA, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar!*



## O que é a Alfaeopetina?

A Alfaeopetina é um medicamento utilizado no tratamento de anemias, que podem ocorrer por vários fatores, como por exemplo a insuficiência renal crônica, pacientes infectados com o vírus da HIV, alguns tipos de câncer e induzida por algumas quimioterapias. Também é utilizado para diminuir as chances de transfusão de sangue á pacientes que passarão por cirurgias.

## Como devo tomar esse medicamento?

A Alfaeopetina é um medicamento de uso subcutâneo ou intravenoso. Cada seringa do medicamento é de dose única.

- ✘ Não reutilizar a seringa depois de aberta.
- ✘ Não devem ser feitas outras medicações na mesma seringa da alfaeopetina



### Como guardar meu medicamento?

Conservar sob refrigeração (entre 2° C e 8° C). Proteger da luz. Não congelar. Não agitar. Os seguintes pontos devem ser considerados: - Eprex® seringa preenchida deve ser conservado na geladeira. Contudo, não guardar no congelador e nem no "freezer". Conservar seu medicamento na embalagem original até o instante de utilizá-lo. Antes de usar, deixe em temperatura ambiente por 15 a 30 minutos, nunca deixando mais de 60 minutos em temperatura ambiente antes da aplicação da injeção. Não deixe o medicamento exposto ao sol. Nunca aqueça a seringa contendo Alfaepoetina.

**✗ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**



### Eu posso tomar outros medicamentos durante o tratamento?

Medicamentos que interferem na eritropoese - processo de produção e maturação das hemáceas - podem interferir na resposta da Alfaepoetina.

Em caso de necessidade de administração de ciclosporina concomitantemente com a alfaepoetina, é necessário acompanhar os níveis de ciclosporina no sangue.



### A Alfaepoetina tem interação com alimentos?

**Não existem evidências de casos de interação entre a alfaepoetina e alimentos.**



### Reações Adversas mais comuns:

A reação adversa mais frequente de pacientes em uso da alfaepoetina é o aumento dose-dependente da pressão arterial ou piora da hipertensão arterial já existente. Desta forma, a pressão arterial deve ser monitorada. Outras reações adversas comuns são erupções cutâneas, diarreia, náusea, vômito, febre, cefaleia e sintomas gripais no início do tratamento.

*Esperamos que seu tratamento ocorra da melhor forma possível, e que seu objetivo terapêutico seja alcançado.*

*Mais uma vez, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre os medicamentos, interações, reações adversas e o que nós, como Farmacêuticas, pudermos esclarecer!*

**Nossos contatos:**

**-Telefone: (31)3769-5022**

**-Whatsapp: (31)98802-3059**

**-e-mail: [farmacia@unimedcl.com.br](mailto:farmacia@unimedcl.com.br)**



***Um grande abraço!***