



# Orientações de Uso de Medicamentos

## Mesilato de Imatinibe

Bem vindo(a) ao programa de Assistência Farmacêutica Unimed Conselheiro Lafaiete!

A partir de agora você contará com todo o suporte e apoio do grupo de nossas Farmacêuticas, para poder dar informações e tirar suas dúvidas e sobre seu medicamento.

Nós elaboramos esse material com as principais informações sobre o tratamento com o IMATINIBE, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar!

### **COMO DEVO TOMAR ESSE MEDICAMENTO?**

A terapia deve ser prescrita por um médico com experiência no uso de terapias com doenças hematológicas e anticâncer. Você deve seguir as orientações da sua prescrição. O dose recomendada deve ser administrada, por via oral, durante uma refeição com um copo grande de água, para reduzir os efeitos gastrointestinais.

- Pacientes com dificuldade de deglutir o comprimido inteiro :

Nesses casos, você pode dissolvê-los em um copo de água ou suco de maçã. O número de comprimidos necessários deverá ser colocado num volume adequado de líquido: Para um comprimido de 100 mg, recomenda-se aproximadamente 50 mL e para um comprimido de 400 mg, aproximadamente 200ml. Misture com uma auxílio de uma colher. A suspensão deve ser administrada imediatamente após a dissolução completa do(s) comprimido(s)

### **O QUE DEVO FAZER SE ESQUECER DE TOMAR UM COMPRIMIDO?**

Se você esqueceu de uma dose, administre assim que lembrar, a menos se estiver perto da próxima dose. Não tome uma dose dobrada para compensar a esquecida.

### **COMO GUARDAR MEU MEDICAMENTO?**

Ele deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15-30°C), protegido da luz e umidade. Em sua embalagem original.



# Orientações de Uso de Medicamentos

## **EU POSSO TOMAR OUTROS MEDICAMENTOS DURANTE O TRATAMENTO?**

O imatinibe quando administrado juntamente com outros medicamentos tem um **grande risco de interações medicamentosas**. Todos os medicamentos que você for utilizar deve ser prescrito por seu médico.

Os medicamentos que são indutores da atividade CYP3A4, podem diminuir a concentração plasmáticas do Imatinibe. Já, os medicamentos que inibem a atividade da isoenzima CYP3A4 do citocromo P450, podem aumentar as concentrações plasmáticas do imatinibe. Por isso, em todas consultas médicas, odontológicas ou com outros profissionais de saúde, **comunique o uso do imatinibe e dos outros medicamentos que você faz uso, para evitar interações medicamentosas ou aumento dos efeitos adversos**.

**Segue a lista de medicamentos, que devem ser evitados, durante o tratamento com mesilato de imatinibe:**

- alguns medicamentos para tratamento de infecções, tais como: CETOCONAZOL, ITRACONAZOL, ERITROMICINA OU CLARITROMICINA;
- alguns medicamentos usados para tratamento de epilepsia, tais como: CARBAMAZEPINA, OXCARBAZEPINA, FENOBARBITAL, FENITOÍNA, FOSFENITOÍNA OU PRIMIDONA;
- alguns medicamentos para tratamento de colesterol alto, tais como: SINVASTATINA;
- alguns medicamentos para tratamento de distúrbios mentais, tais como: BENZODIAZEPÍNICOS OU PIMOZIDA;
- alguns medicamentos para tratamento de pressão sanguínea alta ou distúrbios do coração, tais como: BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO OU METOPROLOL; - RIFAMPICINA, um medicamento para tratamento da tuberculose;
- ERVA DE SÃO JOÃO - um produto fitoterápico utilizado para tratamento da depressão e outras condições (também conhecida como *Hypericum perforatum*);
- DEXAMETASONA - um medicamento anti-inflamatório;
- CICLOSPORINA - um medicamento imunossupressor;
- VARFARINA - um medicamento utilizado no tratamento de distúrbios na coagulação sanguínea (tais como coágulos sanguíneos ou trombozes).

**Se você estiver tomando alguns desses medicamentos, comunique seu médico e farmacêutico para sugerir um medicamento alternative.**

## **REAÇÕES ADVERSAS DO IMATINIBE:**

O imatinibe pode causar o aparecimento de reações adversas, embora nem todas as pessoas as tenham. Porém, pode ser que você não apresente nenhuma delas. As reações mais comuns são:

-



# Orientações de Uso de Medicamentos

- Rápido aumento de peso, inchaço das extremidades (panturrilhas, tornozelos), inchaço generalizado como inchaço na face (sinais de retenção de líquido);
- Fraqueza, sangramento ou contusão espontâneos, infecções frequentes com sinais como febre, calafrios, dor de garganta, úlceras na boca (sinais de baixo nível de células sanguíneas).
- Dor de cabeça, náusea, diarreia, vômito, indigestão, dor abdominal, prurido/vermelhidão/erupção cutânea com sensação de queimação, câibras musculares, dores musculares, dor nos ossos, dor nas articulações.
- Dificuldade para dormir, tontura, formigamento, dor ou dormência das mãos, pés, pernas ou ao redor do quadril, alterações no paladar, diminuição da sensibilidade da pele, olho com secreção e prurido, vermelhidão e inchaço dos olhos (conjuntivite), aumento da produção de lágrimas, olho seco, rubores, sangramentos nasais, boca seca, azia, inchaço abdominal, flatulência, pele seca, afinamento ou queda incomum de cabelo, suores noturnos.
- Febre e ulceração na boca.

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO PACIENTE:**

Comunique o seu médico se:

- Se tiver ou se já teve problemas de fígado, rim ou coração;
- Se você estiver grávida ou suspeita de gravidez ou se você estiver amamentando. Este medicamento não deve ser administrado por grávidas. Em casos de possível chances de gravidez reforce os métodos contraceptivos;
- Se você estiver tomando levotiroxina devido à retirada de sua tireoide;
- Se estiver realizando tratamento com outros medicamentos, em particular aqueles listados na seção “Interações medicamentosas”;
- Se você já teve ou possa ter agora uma infecção por hepatite B. Pois, o mesilato de imatinibe, pode tornar a hepatite B ativa novamente. O seu médico irá verificar se existem sinais dessa infecção antes de iniciar o tratamento com mesilato de imatinibe.

## Orientações de Uso de Medicamentos

- Não utilize fitoterápicos, chás ou outros medicamentos sem orientação médica, pois os mesmos podem interferir na eficácia do tratamento.
- Não exceda a dose diária prescrita por seu médico.
- Se você sentir algum dos sintomas citados acima ou outra manifestação clínica, durante seu tratamento com mesilato de imatinibe, informe ao seu médico e farmacêutico imediatamente. Para melhor decisão sobre seu tratamento.

Esperamos que seu tratamento ocorra da melhor forma possível, e que seu objetivo terapêutico seja alcançado.

Mais uma vez, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre os medicamentos, interações, reações adversas e o que nós, como Farmacêuticas, pudermos esclarecer!

Nosso telefone é o (31)3769-5022 e o nosso whatsapp é o (31)98802-3059.

Um grande abraço!