



Orientações de Uso de Medicamentos

Bem vindo(a) ao programa de Assistência Farmacêutica Unimed Conselheiro Lafaiete!

A partir de agora você contará com todo o suporte e apoio do grupo de nossas Farmacêuticas, para poder dar informações e tirar suas dúvidas e sobre seu medicamento.

Nós elaboramos esse material com as principais informações sobre o tratamento com a HIDROXIURÉIA, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar!



Como devo tomar esse medicamento?

A posologia deve ser baseada no peso real ou ideal do paciente, levando-se em conta o menor valor. Este é um medicamento administrado **por via oral**.



O que devo fazer se esquecer de tomar um comprimido?

Se você esqueceu-se de tomar, procure seu médico. Em caso de dúvidas, procure **orientação do farmacêutico** ou de seu médico.



Como guardar meu medicamento?

Ele deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15-30°C), protegido da luz e umidade. Evitar o calor excessivo. Manter o frasco bem fechado.

✗ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.



Eu posso tomar outros medicamentos durante o tratamento?

O uso simultâneo de hidroxiureia e outros **agentes mielossupressores** ou **radioterapia** pode aumentar a probabilidade de ocorrência de depressão da medula óssea ou outras reações adversas.



Orientações de Uso de Medicamentos



A hidroxiuréia tem interação com alimentos?

Não é relatada interação com alimentos.



Reações Adversas mais comuns:

- No sangue: Depressão da medula óssea (leucopenia, anemia e trombocitopenia)
- No estômago e intestino: Estomatite, anorexia, náusea, vômitos, diarreia, constipação.
- Dermatológicas: Erupção maculopapular, eritema facial, eritema periférico, ulceração da pele, lúpus eritematoso cutâneo e alterações da pele como dermatomiosite. Pigmentação das unhas, eritema, atrofia da pele e unhas, descamação, pápulas violáceas e alopecia em alguns pacientes após vários anos de terapia de manutenção diária, câncer de pele, cutânea, incluindo ulcerações decorrentes da vasculite cutânea e gangrena, ocorreram em pacientes com desordens mieloproliferativas durante a terapia com hidroxiureia. A vasculite cutânea foi relatada mais frequentemente em pacientes com um histórico de, ou recebendo, terapia concomitante com interferon.
- Musculoesqueléticas e do tecido conectivo: Lúpus eritematoso cutâneo.
- Neurológicas: Sonolência, raros casos de cefaleia, tontura, desorientação, alucinações e convulsões.
- Respiratórias: Doença pulmonar intersticial, pneumonite, alveolite, alveolite alérgica, tosse.
- Renais: Níveis elevados de ácido úrico sérico, ureia e creatinina; raros casos de disúria.
- Hipersensibilidade: Febre induzida por medicamentos. Pacientes que apresentam febre alta (> 39 °C) requerem hospitalização.



Orientações de Uso de Medicamentos

- Outras: Febre, calafrios, mal-estar, astenia, azoospermia, oligospermia, elevação de enzimas hepáticas, colestase, hepatite e síndrome da lise tumoral. Retenção anormal de bromossulfaleína. Em pacientes HIV-positivos recebendo terapia combinada de hidroxiureia e outros agentes antirretrovirais, relatou-se pancreatite fatal e não fatal, hepatotoxicidade, e neuropatia periférica grave.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Como a hidroxiureia é um medicamento excretado através da urina, deve-se considerar a redução da dose na população que apresenta algum problema renal.

Esperamos que seu tratamento ocorra da melhor forma possível, e que seu objetivo terapêutico seja alcançado.

Mais uma vez, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre os medicamentos, interações, reações adversas e o que nós, como Farmacêuticas, pudermos esclarecer!

Nossos contatos:

-Telefone: (31)3769-5022

-Whatsapp: (31)98802-3059

-e-mail: farmacia@unimedcl.com.br



Um grande abraço!