

ACIDO CITRICO

Amostra: Urina.

**Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 horas.
O frasco para esta coleta é fornecido pelo laboratório e contém o conservante que não poderá ser desprezado.

ADRENOCORTICOTROFICO, HORMONIO (ACTH)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-DNA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICOAGULANTE LUPICO, PESQUISA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAB)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas. (TRAB)
- Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (>5 mg/dL), a coleta deve ser realizada até no mínimo 8 horas após a última administração

ANTICORPO ANTIMIELOPEROXIDASE, MPO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTI MI-2 AUTO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIESCLERODERMA (SCL 70)

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTINUCLEOSSOMO, SORO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

B.A.A.R. (ZIEHL OU FLUORESCENCIA, PESQUISA DIRETA E APOS HOMOGENEIZACAO)

Amostra: Diversos.

**Orientações sobre este exame, favor entrar em contato com o laboratório.

BLASTOMICOSE

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

CARIOTIPO DE MEDULA (TECNICAS COM BANDAS)

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

É obrigatório que o formulário seja preenchido, assinado e carimbado corretamente pelo médico solicitante e seja entregue no dia da coleta.

CISTINA

Amostra: Urina.

*Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 hrs.

CITOMEGALOVIRUS-QUANTITATIVO, POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

CULTURA, MICOPLASMA OU UREAPLASMA

Amostra: Diversos.

**Necessário agendamento, favor entrar em contato com o laboratório para maiores informações.

DENGUE - IGG E IGM (CADA)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

DIGITOXINA OU DIGOXINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.
Medicação conforme prescrição médica.

FATOR ANTINUCLEO, (FAN)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR VII

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.



www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

FOSFORO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GENOTIPAGEM DO SISTEMA HLA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GLICOSE-6-FOSFATO DEHIDROGENASE (GGFD)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEMOGLOBINA GLICADA (FRACAO A1C)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HOMOCISTEINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HTLV1 OU HTLV2 PESQUISA DE ANTICORPO (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

INIBIDOR DE C1 ESTERASE

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, ETC.) CADA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (>5 mg/dL), a coleta deve ser realizada até no mínimo 8 horas após a última administração.

PEPTIDIO INTESTINAL VASOATIVO, DOSAGEM

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

POTASSIO

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

PROLACTINA

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

Obrigatório repouso de 30 minutos antes da coleta.

PROTEINAS TOTAIS

Amostra: Sangue

** Jejum obrigatório de 8 horas.

SANGUE OCULTO, PESQUISA

Amostra: Fezes.

** Recomenda-se não ingerir bebida alcoólica antes da coleta.

Evitar medicamentos como anti inflamatórios, corticoides, aspirina, composto de ferro, vitamina C, laxante e medicamentos que causam irritação gastrointestinal.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Não realizar coleta em período menstrual e em sangramentos devido a hemorroidas.
Necessário envio de fezes frescas recém-eliminadas coletadas em frasco coletor limpo e seco.

SELENIO, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SIFILIS - FTA-ABS-IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE - 2 DOSAGENS

Amostra: Sangue

**Para realização deste teste o paciente deverá ingerir o dextrosol fornecido pelo laboratório.

A quantidade da coleta deverá ser seguida conforme prescrição médica.

O paciente deverá vir acompanhado.

Jejum de 8 à 12 horas, porém aconselhamos que o jejum não ultrapasse de 10 horas.

TIREOGLOBULINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HIV)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO CITRICO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO OXALICO

Amostra: Urina.

**Evitar limão, abacaxi, morango, gelatina, acerola, laranja, espinafre, tomate, leite e derivados. Evitar qualquer alimento ou medicamento que contenha Vitamina C 48 horas antes e durante a coleta.

**Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 hrs.

**O frasco para esta coleta é fornecido pelo laboratório e contém o conservante que não poderá ser desprezado.

ADENOVIRUS, IGM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-JO1

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-RO/SSA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICARDIOLIPINA - IGA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IGG, IGM, IGA (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTIPNEUMOCOCO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTITIREOIDE (TIREOGLOBULINA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGLIADINA (GLUTEN) - IGA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIMITOCONDRIA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO LIVRE (PSA LIVRE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Nas situações abaixo recomenda-se aguardar o tempo indicado antes da coleta do material:



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

- Após relação sexual com ejaculação, aguardar 2 dias;
- Após prática de ciclismo/equitação, aguardar 2 dias;
- Após cateterismo/sondagem uretral, aguardar 3 dias;
- Após toque retal/prostático, aguardar 3 dias;
- Após uso de supositório, aguardar 3 dias;
- Após Ultra-sonografia transretal, aguardar 7 dias;
- Após colonoscopia, aguardar 15 dias;
- Após massagem prostática, aguardar 6 semanas;
- Após biópsia prostática, aguardar 6 semanas.

CALCIO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CD ... (ANTIGENO DE DIF. CELULAR, CADA DETERMINACAO)

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda à quinta-feira.

CHAGAS IGG

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CISTICERCOSE, AC

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOXINA A



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Amostra: Fezes.

** Necessário envio de fezes frescas recém-eliminadas coletadas em frasco coletor limpo, seco e sem aditivos.

** Usar laxativos somente quando houver orientação médica.

** Não é necessário jejum ou cuidados especiais.

** Evitar o uso de antiácidos e de contraste oral (utilizado em exames radiológicos) no mínimo 72 horas antes da coleta das fezes ou conforme orientação médica.

** Exame realizado de Segunda à Sexta-feira.

COMPLEMENTO C5

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

COMPLEMENTO CH-50

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CREATINO FOSFOQUINASE

Amostra: Sangue

** Jejum: para todas as idades jejum mínimo necessário de 3 horas.

** Orientações para o cliente: até 72 horas antes da coleta, o cliente deve evitar a prática de exercícios físicos intensos, a exemplo de corridas de longa distância e musculação, especialmente quando estes causam dor muscular pós-exercício. O cliente não pode fazer eletroneuromiografia três dias antes da coleta.

** Em caso de ter feito biópsia muscular, é necessário aguardar 30 dias para a dosagem de creatinoquinase.

-Antes da coleta o paciente terá que ficar de repouso por meia-hora.

CURVA GLICEMICA (4 DOSAGENS) VIA ORAL OU ENDOVENOSA

Amostra: Sangue

**Para realização deste teste o paciente deverá ingerir o dextrosol fornecido pelo laboratório.

A quantidade da coleta deverá ser seguida conforme prescrição médica.

O paciente deverá vir acompanhado.

Jejum de 8 à 12 horas, porém aconselhamos que o jejum não ultrapasse de 10 horas.

CURVA GLICEMICA (6 DOSAGENS)

Amostra: Sangue

**Para realização deste teste o paciente deverá ingerir o dextrosol fornecido pelo laboratório.

A quantidade da coleta deverá ser seguida conforme prescrição médica.

O paciente deverá vir acompanhado.

Jejum de 8 à 12 horas, porém aconselhamos que o jejum não ultrapasse de 10 horas.

DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Informar o uso de medicamentos, principalmente corticosteróide.

FERRO SERICO

Amostra: Sangue

**Jejum obrigatório de 8 horas coletadas logo pela manhã.

FOLICULO ESTIMULANTE, HORMONIO (FSH)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR REUMATOIDE, TESTE DO LATEX (QUALITATIVO)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

Bebida alcoólica: A abstinência é desejável nas 72 horas que antecedem o teste.

Medicação: Suspender medicamentos (a critério médico) a base de fenitoína, fenobarbital e acetaminofen.

GASOMETRIA (PH, PCO₂, SA, O₂, EXCESSO BASE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GONADOTROFICO CORIONICO, HORMONIO (HCG)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GRUPO SANGUINEO ABO, E FATOR RHO (INCLUI DU)

Amostra: Sangue

**Não é necessário jejum ou cuidados especiais.

HELICOBACTER PYLORI - IGA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

HEMOCULTURA (POR AMOSTRA)

Amostra: Sangue

**Não é necessário jejum.

Medicação somente sob orientação médica.

HEPATITE B - HBEAG (ANTIGENO E)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE C (QUALITATIVO) POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE C-GENOTIPAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HORMONIO GONODOTROFICO CORIONICO QUANTITATIVO (HCG-BETA-HCG)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

IGE, TOTAL

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

LEUCOCITOS E HEMACIAS, PESQUISA NAS FEZES

Amostra: Fezes.

**O exame não deve ser realizado se o paciente fez o uso de laxantes, antidiarreicos, antiácidos e contrastes radiológicos (somente com orientação médica).
Necessário envio de fezes frescas recém eliminadas coletadas em frasco coletor limpo e seco.

LINFOCITOS T HELPER CONTAGEM DE (IF COM OKT-4) (CD-4+) CITOMETRIA DE FLUXO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda à quinta-feira.

MAGNESIO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MICROALBUMINURIA (RIE)

Amostra: Urina.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

**Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 02 horas após a última micção. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

PEPTIDEO C

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PROGESTERONA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PROTEINAS DE BENICE JONES, PESQUISA

Amostra: Urina.

**Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 horas.

PROTOMBINA - DETECCAO DA MUTACAO NO GENE G20210A

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ROTINA DE URINA (CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA), EXA

Amostra: Urina.

**Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã, jato médio.

Realizar higienização da região genital com água e sabão;

Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário;

Sem interromper a micção, coletar urina do jato médio;

Desprezar o restante da urina no vaso sanitário;

Fechar o frasco de coleta;

Encaminhar o frasco para o laboratório mantendo-o em local fresco e ao abrigo da luz.

Colher em frasco limpo e próprio para a coleta de urina.

No caso de crianças que necessitem de saco coletor, o mesmo deve ser colocado após a adequada higienização, e se não ocorrer a micção em um prazo de 60 minutos, o saco coletor deverá ser trocado, até que ocorra espontânea micção.

T3 REVERSO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TRANSAMINASE PIRUVICA (AMINO TRANSFERASE DE ALANINA)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS (PARA TETRACLOROETILENO, TRICLOROETANO, TRICLOROETILEN)

Amostra: Urina.

**Coletar urina do início do último dia da jornada de trabalho (recomenda-se evitar o primeiro dia de jornada da semana). Manter amostra refrigerada desde o momento da coleta.

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 72 horas.

VANCOMICINA, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TEMPO DE PROTROMBINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

1,25-DIHDROXI VITAMINA D

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO FOLICO, DOSAGEM NOS ERITROCITOS

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO METILHIPURICO (PARA XILENOS)

Amostra: Urina.

**Evitar a ingestão de ácido acetil salicílico.

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 72 horas.

Coletar urina do início do último dia da jornada de trabalho, ou após o período de exposição (recomenda-se evitar a primeira jornada da semana).

ALFA-1-ANTITRIPSINA, (FEZES)

Amostra: Fezes.

** - Usar laxativos somente com orientação médica, evitar o uso de antiácidos e de contraste oral no mínimo 72 horas antes da coleta das fezes ou conforme orientação médica.

ALFA-FETOPROTEINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANDROSTENEDIONA

Amostra: Sangue

**Jejum: Não é necessário jejum ou cuidados especiais.
Exercícios: Evitar a realização de atividade física.

ANTI-LKM-1

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTI-ILHOTA DE LANGHERANS

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGENO NS1 DO VIRUS DA DENGUE, PESQUISA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIMUSCULO LISO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIPARIETAL

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTITROMBINA III, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

C- TELOPEPTIDEO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (>5 mg/dL), a coleta deve ser realizada até no mínimo 8 horas após a última administração.

CA 50

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CHLAMYDIA - PCR, AMPLIACAO DE DNA

Amostra: Diversos.

**Necessário agendamento, favor entrar em contato com o laboratório para maiores informações.

CLORO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

COAGULOGRAMA (TS, TC, PROVA DO LACO, RETRACAO DO COAGULO, CONTAGEM DE PLAQUETAS Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

COLINESTERASE (PARA CARBAMATOS ORGANOFOSFORADOS)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CORTISOL

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Colher entre 7:00 e 9:00 horas da manhã (preferencialmente às 8:00 horas).

CULTURA BACTERIANA (EM DIVERSOS MATERIAIS BIOLÓGICOS)

Amostra: Diversos.

**Para orientação desse procedimento favor entrar em contato com o Laboratório.

DISMORFISMO ERITROCITÁRIO, PESQUISA (CONTRASTE DE FASE)

Amostra: Urina.

**Este exame necessita que seja coletado a 2ª urina do dia, com intervalo mínimo de 02 horas após a primeira micção.

FIBRINOGENIO, TESTE FUNCIONAL, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FOSFATASE ALCALINA FRACAO OSSEA - ELISA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FOSFOLÍPIDIOS

Amostra: Sangue

**Jejum de 4 horas.

GLICOSE

Amostra: Sangue

**Jejum obrigatório de 8 horas.

HEMATOCRITO, DETERMINAÇÃO DO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE A - HAV - IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B (QUALITATIVO) PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B (QUANTITATIVO) PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B - HBCAC - IGG (ANTI-CORE IGG OU ACOREG)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B - HBCAC - IGM (ANTI-CORE IGM OU ACOREM)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE C - ANTI-HCV

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

HISTONA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

HIV - ANTIGENO P24

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HIV - CARGA VIRAL PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HORMONIO ANTI MULLERIAN (MULLER)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MICROALBUMINURIA (RIE)

Amostra: Urina.

**Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 hrs.

PARASITOLÓGICO

Amostra: Fezes.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

**Exame de Parasitológico quando for acima de 1 amostra, a coleta deve ser realizada em dias alternados e entregue para o laboratório. Armazenar o material somente por 12 horas refrigerado.

RUBEOLA - ANTICORPOS IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

RUBEOLA - ANTICORPOS IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SARAMPO - ANTICORPOS IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES

Amostra: Fezes.

**Não fazer o uso de vitamina C medicamentoso, penicilina e tetraciclinas, pois quando administradas em grandes doses podem positivar a reação. Não utilizar laxante ou supositório.

Necessário envio de fezes frescas recém-eliminadas coletadas em frasco coletor limpo, seco e sem aditivos.

TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS (PARA TETRACLOROETILENO, TRICLOROETANO, TRICLOROETILEN Amostra: Sangue

**Coletar urina do final do último dia da jornada de trabalho, ou após o período de exposição (recomenda-se evitar a primeira jornada da semana). Manter amostra refrigerada desde o momento da coleta.

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 72 horas.

UREIA



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

WAALER-ROSE (FATOR REUMATOIDE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TEMPO DE COAGULACAO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACETILCOLINA, ANTICORPOS LIGADOR RECEPTOR

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO METILHIPURICO (PARA XILENOS)

Amostra: Urina.

**Evitar a ingestão de ácido acetil salicílico.

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 72 horas.

Coletar urina do final do último dia da jornada de trabalho, ou após o período de exposição (recomenda-se evitar a primeira jornada da semana).

ACIDO URICO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ALBUMINA

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-SM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICENTROMERO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTINEUTROFILOS (ANCA) P

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE, CITOMEGALIA, RUBEOLA, EB E OUTROS, CADA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

BACTERIOSCOPIA (GRAM, ZIEHL, ALBERT ETC), POR LAMINA

Amostra: Diversos.

**Caso o paciente esteja fazendo o uso de antibiótico, deve-se fazer a coleta 48 horas após o término do medicamento tópico (pomadas) e 7 dias no caso de antibiótico oral. Não fazer uso de antissépticos; Manter abstinência de relação sexual nas últimas 24 horas anteriores à coleta; no período anterior da coleta não usar ducha ginecológica e no dia da coleta comparecer ao laboratório sem tomar banho.

BORDETELLA PERTUSSIS (COQUELUCHE) ANTICORPOS IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

CALPROTECTINA FECAL

Amostra: Fezes.

** Medicação: Usar laxativos somente quando houver orientação médica.

CAXUMBA, IGM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CD ... (ANTIGENO DE DIF. CELULAR, CADA DETERMINACAO)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda a quinta-feira

CHAGAS IGM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

COOMBS INDIRETO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

COLESTEROL (VLDL)

Amostra: Sangue

** - Jejum obrigatório de 12 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

FALCIZACAO, TESTE DE



Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE A - HAV - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HTLV I / II POR PCR (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

LINFOCITOS T SUPRESSORES CONTAGEM DE (IF COM OKT-8) (D-8) CITOMETRIA DE FLUXO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda a quinta-feira.

MACROPROLACTINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MONONUCLEOSE - EPSTEIN BARR - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PLASMODIO, PESQUISA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PROTEINAS DE BENICE JONES, PESQUISA

Amostra: Urina.

**Coletar a urina de 12 horas desprezando a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 12 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 hrs.

RETICULOCITOS, CONTAGEM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

RUBEOLA - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

RUBEOLA - IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TACROLIMUS

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TESTOSTERONA TOTAL

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TRANSFERRINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TRIIODOTIRONINA (T3)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

VITAMINA A, DOSAGEM

Amostra: Sangue *

*Jejum de 8 horas.

VITAMINA B12

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ZINCO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ALFA-1-ANTITRIPSINA, DOSAGEM NO SORO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICARDIOLIPINA - IGG

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.



ANTICORPOS ANTI RAIVA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTIINSULINA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.
- Coleta não realizada em terças e quartas feiras.

ANTIGLIADINA (GLUTEN) - IGG

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGLIADINA (GLUTEN) - IGM

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ASLO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.
- Informar o uso de medicamentos ou a existência de patologia tireoidiana.

BETA-2-MICROGLOBULINA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

BILIRRUBINAS TOTAL DIRETA E INDIRETA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Medicamentos à base de anfotericina b, levodopa, nitrofurantoína e piroxicam devem ser suspensos, a critério médico.

C1Q

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

CARBAMAZEPINA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Manter uso de medicação conforme prescrição médica.

CITOMEGALOVIRUS-QUALITATIVO, POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

COLESTEROL TOTAL

Amostra: Sangue

** - Jejum obrigatório de 12 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO MB

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CRESCIMENTO, HORMONIO DO (HGH)



Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ELETROFERESE DE PROTEINAS

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ESTRADIOL

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ESTRONA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR V DE LAYDEN POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.

FERRITINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FRUTOSAMINAS (PROTEINAS GLICOSILADAS)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FUNGOS, PESQUISA DE (A FRESCO LACTOFENOL, TINTA DA CHINA)

Amostra: Diversos.

**Orientações sobre este exame, favor entrar em contato com o laboratório.

GLICOSE-6-FOSFATO DEIDROGENASE (G6FD)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HAPTOGLOBINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B - HBEAC (ANTI HBE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HERPES SIMPLES - IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGE, POR ALERGENO (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA

Amostra: Sangue

**Para realização deste teste o paciente deverá ingerir a lactose fornecida pelo laboratório.

A quantidade da coleta deverá ser seguida conforme prescrição médica.

O paciente deverá vir acompanhado.

Jejum de 8 à 12 horas, porém aconselhamos que o jejum não ultrapasse de 10 horas.

LAMOTRIGINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, ETC.) CADA

Amostra: Sangue

**- Jejum aconselhável de 4 horas.

- Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (>5 mg/dL), a coleta deve ser realizada até no mínimo 8 horas após a última administração.

PEPTIDEO NATRIURETICO BNP/PROBNP

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas

PROTEINA C REATIVA, QUALITATIVA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SODIO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO OXALICO

Amostra: Urina.

**Evitar limão, abacaxi, morango, gelatina, acerola, laranja, espinafre, tomate, leite e derivados. Evitar qualquer alimento ou medicamento que contenha Vitamina C 48 horas antes e durante a coleta.

Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 02 horas após a última micção. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

ALDOLASE

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

ALDOSTERONA

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

ALUMINIO, DOSAGEM NO SORO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Medicamentos que apresentem alumínio em sua composição devem ser evitados.

ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE - IGA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS NATURAIS - ISOAGLUTININAS, PESQUISAS

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

APOLIPOPROTEINA A

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Sugere-se a suspensão de qualquer medicamento à base de andrógenos, diuréticos e corticosteroides, a critério médico.

CALCIO IONICO

Amostra: Sangue

*Jejum aconselhável de 4 horas.

CAXUMBA, IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

CERULOPLASMINA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CITOMEGALOVIRUS IGG

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CLEARANCE DE CREATININA

Amostra: Sangue e urina.

**Na entrega do exame de urina, o paciente deverá vir em jejum para a coleta sangue.
Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas

fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 horas.

COMPLEMENTO C3

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CREATININA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CULTURA PARA FUNGOS

Amostra: Diversos.

**Orientações sobre este exame, favor solicitar ao laboratório.

DEHIDROTESTOSTERONA (DHT)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

DESIDROGENASE LACTICA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS

Amostra: Sangue

** - Jejum:

Até 1 ano: Jejum de 3 a 4 horas

De 1 a 5 anos: Jejum de 6 a 8 horas

De 6 a 10 anos: Jejum de 10 a 12 horas

Acima de 10 anos: Jejum de 12 a 14 horas.

ERROS INATOS DO METABOLISMO BATERIAS DE TESTES QUIMICOS DE TRIAGEM EM URINA (MI)

Amostra: Sangue

** - Necessário informar medicamentos em uso.

- Orientações sobre este exame, favor entrar em contato com o laboratório.

ESPERMOGRAMA (CARACTERES FISICOS, PH, FLUDIFICACAO, MOTILIDADE, VITALIDADE, CON

Amostra: Esperma.

**Este exame requer abstinência sexual, ou última ejaculação em 5 dias e necessita de agendamento para realização do exame.

FATOR VIII, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

- Este exame é realizado no Hospital Unimed Itapetininga.

GONADOTROFICO CORIONICO, HORMONIO (HCG)

Amostra: Sangue

**Não há a necessidade de ser colhido em jejum.

HEMOSEDIMENTACAO, (VHS)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE B - HBSAC (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

HEPATITE C (QUANTITATIVO) POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

METANEFRIAS URINARIAS, DOSAGEM DAS

Amostra: Urina.

**24 horas antes da coleta de urina o paciente deverá evitar a ingestão de fumo, café, chá, refrigerantes com cola.

Coletar urina de 24 horas em frasco limpo contendo conservante.

Evitar a ingestão de cafeína antes e durante a coleta.

Desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas.

Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 horas.

MICROALBUMINURIA (RIE)

Amostra: Urina.

**Coletar a urina de 12 horas desprezando a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 12 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Entregar para o laboratório até as 11:00 horas.

OSMOLALIDADE, DETERMINAÇÃO

Amostra: Urina.

**Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 04 horas após a última micção. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

PROTEÍNAS DE BENCE JONES, PESQUISA

Amostra: Urina

**Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 02 horas após a última micção. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (S-DHEA)



Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

T3 LIVRE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TESTOSTERONA LIVRE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TOXOPLASMOSE IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TROPONINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

"LINFOCITOS T ""HELPER"" CONTAGEM DE (IF COM OKT-4) (CD-4+) CITOMETRIA DE FLUXO"

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda à quinta-feira.

ACIDO ASCORBICO

Amostra: Sangue

**Jejum de 8 horas.

ACIDO LACTICO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.
Evitar a realização de atividade física no dia anterior da coleta.

ACIDO VALPROICO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.
Manter uso de medicação conforme prescrição médica.

ACIDOS ORGANICOS (PERFIL QUANTITATIVO)

Amostra: Urina.

**Coletar primeira urina da manhã. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

ADENOSINA DE AMINASE (ADA)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

AMILASE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI NUCLEOSSOMO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-DNA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-RO/SSA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-TPO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICARDIOLIPINA - IGM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (CEA)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina (>5 mg/dL), a coleta deve ser realizada até no mínimo 8 horas após a última administração.

ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO TOTAL (PSA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Nas situações abaixo recomenda-se aguardar o tempo indicado antes da coleta do material:

- Após relação sexual com ejaculação, aguardar 2 dias;
- Após prática de ciclismo/equitação, aguardar 2 dias;
- Após cateterismo/sondagem uretral, aguardar 3 dias;



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

- Após toque retal/prostático, aguardar 3 dias;
- Após uso de supositório, aguardar 3 dias;
- Após Ultra-sonografia transretal, aguardar 7 dias;
- Após colonoscopia, aguardar 15 dias;
- Após massagem prostática, aguardar 6 semanas;
- Após biópsia prostática, aguardar 6 semanas;

AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE, CITOMEGALIA, RUBEOLA, EB E OUTROS, CADA

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO

Amostra: Sangue

** Jejum obrigatório de 8 horas.

CISTINA

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

COLESTEROL VLDL

Amostra: Sangue

- ** - Jejum obrigatório de 12 horas.
- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

COMPLEMENTO C4

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas

.

COOMBS DIRETO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

CURVA DE HGH COM CLONIDINA (CADA DOSAGEM)

Amostra: Sangue

** - Jejum de 8 à 12 horas, porém aconselhamos que o jejum não ultrapasse de 10 horas.

- O paciente deverá vir acompanhado.
- Necessário agendamento para realização do exame.
- Favor entrar em contato com o laboratório para maiores informações.

ESTEATOCRITO, TRIAGEM PARA GORDURA FECAL

Amostra: Fezes.

** Colher as fezes sem uso de laxante e ou supositórios
Necessário envio de fezes frescas recém eliminadas coletadas em frasco coletor limpo, seco e sem aditivos.

ESTRIOL

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR V, DOSAGEM

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.

FENITOINA

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

Colher o exame 2 horas antes da próxima dosagem do medicamento ou conforme orientação médica.

FOSFATASE ALCALINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

GAD-AB-ANTIDECARBOXILASE DO ACIDO

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

GORDURA FECAL, DOSAGEM

Amostra: Fezes.

**Necessário envio de fezes frescas recém eliminadas coletadas em frasco coletor limpo, seco e sem aditivos.

Coletar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal.

O paciente precisa alimentar-se normalmente com a dieta que esteja lhe causando o distúrbio digestivo.

Colher as fezes sem uso de laxante e ou supositórios.

HELICOBACTER PYLORI - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEMOGLOBINA, ELETROFORESE

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

HEPATITE C - ANTI-HCV

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGF BP3 (PROTEINA LIGADORA DOS FATORES DE CRESCIMENTO INSULIN-LIKE)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGG, SUBCLASSES 1,2,3,4 (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGE, POR ALERGENO, (CADA)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

LIPASE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PESQUISA PARA HAEMOPHILUS DUCREYI

Amostra: Sangue

**Orientações sobre este exame, favor entrar em contato com o laboratório.

PROTEINA C

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SARAMPO - ANTICORPOS IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SCHISTOSOMOSE - IGG



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SIFILIS - FTA-ABS-IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

T4 LIVRE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TRANSAMINASE OXALACETICA (AMINO TRANSFERASE ASPARTATO)

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

VITAMINA B1, DOSAGEM

Amostra: Sangue

** - Jejum de 8 horas.

- O exame deve ser coletado pela manhã em jejum e antes de qualquer medicação.

VITAMINA D 25 HIDROXI, DOSAGEM (VITAMINA D3)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

"VITAMINA ""D"" 25 HIDROXI, DOSAGEM (VITAMINA D3)"

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

ACIDO CITRICO

Amostra: Urina.

**Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou com intervalo mínimo de 02 horas após a última micção. Desprezar o primeiro jato de urina, e sem interromper a micção, coletar o segundo jato de urina.

ADENOVIRUS, IGG

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-LA/SSB

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTI-RNP

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTICORPOS ANTI PEPTIDEO CICLICO CITRULINADO - IGG

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO LIVRE (PSA LIVRE INCLUINDO PSA TOTAL)

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

Nas situações abaixo recomenda-se aguardar o tempo indicado antes da coleta do material:

- Após relação sexual com ejaculação, aguardar 2 dias;
- Após prática de ciclismo/equitação, aguardar 2 dias;
- Após cateterismo/sondagem uretral, aguardar 3 dias;
- Após toque retal/prostático, aguardar 3 dias;



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

- Após uso de supositório, aguardar 3 dias;
- Após Ultra-sonografia transretal, aguardar 7 dias;
- Após colonoscopia, aguardar 15 dias;
- Após massagem prostática, aguardar 6 semanas;
- Após biópsia prostática, aguardar 6 semanas.

ANTI RECEPTOR DE ACETILCOLINA

Amostra: Sangue

**Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas.

CARIOTIPO DE SANGUE (TECNICAS COM BANDAS)

Amostra: Sangue

**Para realização desse exame necessita que seja entregue formulário preenchido e pedido médico.

**Jejum aconselhável de 4 horas.

Exame realizado de Segunda à sexta-feira.

CHUMBO

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

COBRE

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

COLESTEROL (HDL)

Amostra: Sangue

** - Jejum obrigatório de 12 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

COLESTEROL (LDL)

Amostra: Sangue

** - Jejum obrigatório de 12 horas.

- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

CULTURA BACTERIANA (EM DIVERSOS MATERIAIS BIOLÓGICOS)

Amostra: Diversos.

**Caso o paciente esteja fazendo o uso de antibiótico, deve-se fazer a coleta 48 horas após o término do medicamento tópico (pomadas) e 7 dias no caso de antibiótico oral. Não fazer uso de antissépticos; Manter abstinência de relação sexual nas últimas 24 horas anteriores à coleta; no período anterior da coleta não usar ducha ginecológica e no dia da coleta comparecer ao laboratório sem tomar banho.

CULTURA, FEZES: SALMONELLA, SHIGELLA E ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICAS (SORO)

Amostra: Fezes.

**Necessário envio de fezes frescas recém eliminadas coletadas em frasco coletor limpo e seco. Não refrigerar.

A coleta deve ser realizado no início dos episódios de diarreia.
O paciente não pode estar fazendo uso de antibióticos.

CULTURA, URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS

Amostra: Urina.

**Em caso de uso de antibiótico, deve-se aguardar 3 dias após o término do medicamento para realização do exame ou de acordo com orientação médica.
Este exame deve ser coletado preferencialmente na Unidade de Atendimento do Laboratório.

Realizar higienização da região genital com água e sabão;

Iniciar a micção, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário;

Sem interromper a micção, coletar urina do jato médio;

Desprezar o restante da urina no vaso sanitário;

Fechar o frasco de coleta;

No caso de crianças que necessitem de saco coletor, o mesmo deve ser colocado após a



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

adequada higienização, e se não ocorrer a micção em um prazo de 30 minutos, o saco coletor deverá ser trocado, até que ocorra espontânea micção. Pede-se para não usar pomadas para assaduras no dia da coleta.

DIMERO D

Amostra: Sangue

** Jejum aconselhável de 4 horas.

ERITROPOIETINA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR II, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.

FATOR REUMATOIDE, TESTE DO LATEX

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

FATOR VIII, DOSAGEM DO ANTIGENO (VON WILLEBRAND)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.

FATOR XIII, PESQUISA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

- Exame realizado no Hospital Unimed Itapetininga.



GLOBALINA DE LIGACAO DE HORMONIOS SEXUAIS (SHBG)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HELICOBACTER PYLORI - IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEMOGLOBINA, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HERPES SIMPLES - IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

HIV - QUALITATIVO POR PCR

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

IGM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.



IMUNOFIXACAO - CADA FRACAO

Amostra: Sangue

**Jejum obrigatório de 8 horas.

INSULINA

Amostra: Sangue

**Jejum obrigatório de 8 horas.

LEPTOSPIRA (CAMPO ESCURO APOS CONCENTRACAO) PESQUISA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MIOGLOBINA, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

MONONUCLEOSE, ANTI-VCA (EBV) IGM

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

PARATORMONIO - MOLECULA INTACTA

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PEPTIDEO NATRIURETICO BNP/PROBNP

Amostra: Sangue

** - Jejum aconselhável de 4 horas.

PROTEINA S, TESTE FUNCIONAL



Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

PROTEINA S LIVRE, DOSAGEM

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SIFILIS - VDRL

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

SOMATOMEDINA C (IGF1)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TIROXINA (T4)

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TOXOPLASMOSE IGG

Amostra: Sangue

**Jejum aconselhável de 4 horas.

TRIGLICERIDEOS

Amostra: Sangue

** - Jejum de 12 horas. (o Jejum é OBRIGATÓRIO DE 12 HORAS).
- Não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes do exame.

VITAMINA E

Amostra: Sangue



www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

**Jejum de 8 horas.