



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

ULTRASSOM TRANSVAGINAL

- Não estar no período menstrual.

ULTRASSOM PROSTATA TRANSRETAL

- Logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante junto com 40 gotas de luftal, repetir o luftal de 6/6 horas até à noite.
- No dia do exame vir com 06 horas de jejum.

DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA

- Logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante junto com 40 gotas de luftal, repetir o luftal de 6/6 horas até à noite.
- No dia do exame vir com 06 horas de jejum.

DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIAS

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.

DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 35.302-7





Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

- Jejum de 6 horas.

DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal a noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREOIDE E FARINGE)

Sempre verificar se é com ou sem contraste.

Se for com contraste:

Verificar se o paciente é diabético ou se tem alguma alergia a iodo, caso o paciente tome medicação para diabete a base de: Metformina, Glifage, Glucoformin, Glucophge, Meguanin ou Dimefor, é necessário falar com o medico para suspender o uso por 72 hrs antes do exame e 72 hrs depois.

PERGUNTAR O MOTIVO DO EXAME (Se o motivo for : Prolactina alta, Tireóide, Menstruação desregulada, e se o médico solicitando for endócrino 90% dos casos é SELA TURSICA ou HIPÓFISE ou SELA TURCA), esses exames são sempre realizados com contraste.

Caso o exame seja com contraste é necessário 6 horas de jejum

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR (ATE 3 SEGMENTOS)

- Nenhum tipo de preparo, salvo casos em que o paciente já tenha realizado cirurgia de coluna ou tenha história prévia de neoplasia. Diante desta situação deve-se conversar com o médico Radiologista a respeito da necessidade do contraste;
- Se for utilizado o meio de contraste endovenoso, deve ser cumprido o jejum total de 4 horas. Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água;



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.

ULTRASSOM MAMAS

Não passar hidratante nas mamas e nem desodorante nas axilas.

Trazer mamografia e exames anteriores.

ULTRASSOM ABDOME TOTAL

- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 40 gotas de Luftal.
- Repetir o Luftal de 6/6 horas.
- Fazer dieta leve durante o dia.

Quando Criança (PARA REFLUXO- RGE):

- Jejum de 4 horas.
- Suspender a medicação, leite anti refluxo 48 horas antes do exame.
- Trazer mamadeira pronta para tomar durante o exame.
- Jejum de 6 horas.
- Bexiga cheia, tomar apenas água no dia do exame.

ULTRASSOM ABDOME SUPERIOR

- Jejum de 6 horas.

ULTRASSOM APARELHO URINARIO FEMININO

- Bexiga cheia
- Trazer exames anteriores

ULTRASSOM APARELHO URINARIO MASCULINO

- Bexiga cheia
- Trazer exames anteriores

ULTRASSOM ABDOME INFERIOR MASCULINO

- Bexiga cheia.



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

ULTRASSOM ESTRUTURAS SUPERFICIAIS

- Em região do pescoço não passar nada.

ULTRASSOM OBSTETRICIA

- Trazer carteirinha de Pré Natal.
- Trazer DVD (opcional).

ULTRASSOM OBSTETRICA MORFOLOGICA

I TRIMESTRE TRANS TRANSLUCÊNCIA NUCAL

- De 11 a 14 semanas.
- Trazer DVD (opcional).

II TRIMESTRE TRANS TRANSLUCÊNCIA NUCAL

- De 20 a 26 semanas.
- Trazer DVD (opcional).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX

- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
- "Clientes menores de 10 anos, ou com necessidades especiais, impossibilitados em permanecerem imóveis na hora da realização do exame, deve-se marcar avaliação com o médico Anestesista."



Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL

- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR

ABDÔMEN SUPERIOR:

- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ARTICULAÇÃO

- Nenhum tipo de preparo, salvo casos em que o cliente já tenha realizado cirurgia de coluna ou tenha história prévia de neoplasia. Diante desta situação deve-se conversar com o médico Radiologista a respeito da necessidade do contraste;
- Se for utilizado o meio de contraste endovenoso, deve ser cumprido o jejum total de 6 horas. Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água;



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 35.302-7





Medicina Diagnóstica

Unimed 
Sul Paulista

www.unimedspaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T.(15) 3376-9802

- Trazer Tomografia Computadorizada, Raios-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS

- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.
- "Clientes menores de 10 anos, ou com necessidades especiais, impossibilitados em permanecer imóveis na hora da realização do exame, deve-se marcar avaliação com o médico Anestesista."

DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS

- Na Véspera do Exame, logo após o café da manhã tomar 1 Comprimido de Laxante (Dulcolax + 40 gotas de Luftal. Repetir o Luftal de 6/6 horas
- Fazer uma Dieta Leve durante o dia.
- Jejum de 6 horas, tomar apenas água no dia do exame.

ULTRASSOM ABDOME INFERIOR FEMININO

- Bexiga cheia.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVE OU BACIA

- Os Clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin®, Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de



Medicina Diagnóstica



www.unimedsulpaulista.coop.br
Rua Virgílio de Rezende, 815 - Centro
CEP 18200-046 - Itapetininga SP
T. (15) 3376-9802

Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;

- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Clientes com uréia e creatinina alterados, avisar o Radiologista;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.
- Em caso de exames contrastados trazer acompanhante.

ULTRASSOM - APARELHO URINÁRIO

- Necessário estar com a bexiga cheia.