

US TORACICO EXTRACARDIACO

- Não possui preparos.

US MAMAS

- Não tem preparos
- (trazer exames anteriores)

US ABDOME TOTAL (ADULTO)

- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 40 gotas de Luftal;
- Repetir o Luftal de 6/6 horas;
- Fazer dieta leve durante o dia;
- Bexiga cheia, tomar apenas água no dia do exame;
- Jejum de 6 horas.

PREPAROS:(CRIANÇA)

- Na véspera do exame, logo após o café da manhã dar 1 gota por kilo de Luftal;-
Repetir a cada 6/6 horas;
- Fazer dieta leve durante o dia;
 - Bexiga cheia, tomar apenas água no dia do exame;
 - Jejum de 4 horas.

(CRIANÇA PARA REFLUXO)

Quando Criança (PARA REFLUXO- RGE):

- Jejum de 4 horas
- Suspende a medicação, leite anti refluxo 48 horas antes do exame;
- Trazer mamadeira pronta para tomar durante o exame.

US ABDOME SUPERIOR

- 6 Horas de jejum

US ABDOME INFERIOR MASCULINO

- Bexiga cheia

US ABDOME INFERIOR FEMININO

- Bexiga cheia

US ORGÃOS SUPERFICIAIS

- Quando região do pescoço não passar nada.

US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS

- Quando região do pescoço não passar nada.



US ARTICULAR

- Não possui preparos.

(Caso paciente utilize tala, solicitar para o paciente retirar 2 boras antes do exame).

US OBSTETRICA

- Trazer carteirinha Pré-natal.

US OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER

- Trazer carteirinha Pré-natal.

US OBSTETRICA MORFOLOGICA

- REALIZAR DENTRO DAS SEMANAS:

(1° trimestre de 10 a 14 semanas)

(2° trimestre de 20 a 24 semanas).

US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL

- REALIZAR DENTRO DAS SEMANAS:

(1° trimestre dentro de 10 a 14 semanas).

US TRANSVAGINAL

- Não estar no período menstrual

US PROSTATA TRANSRETAL PREPAROS:

- Logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante junto com 40 gotas de luftal;

- Repetir o luftal de 6/6 horas até à noite;

- No dia do exame vir com 06 horas de jejum.

US DOPPLER COLORIDO TRANSCRANIANO OU TRANSFONTANELA

- Realizado até 01 anos de idade.

US DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS

- Não possui preparos.

US DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSO BILATERAL

- Não possui preparos.

US DOPPLER COLORIDO DE ORGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA

- Não possui preparos.



US DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAIS

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal;
- A noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);- Repetir o luftal em 6/6 horas;- Fazer uma dieta leve durante o dia;- Jejum de 6 horas.

US DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal
- A noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.

US DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR

- Na ante véspera do exame tomar 40 gotas de luftal;
- A noite e repetir de 6/6 horas até o dia do exame;
- Na véspera do exame, logo após o café da manhã tomar 1 comprimido de laxante (dulcolax + 40 gotas de luftal);
- Repetir o luftal em 6/6 horas;
- Fazer uma dieta leve durante o dia;
- Jejum de 6 horas.

US DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIOR UNILATERAL

- Não possui preparos.

US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL

- Não possui preparos.

US DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL

- Não possui preparos.

US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL

- Não possui preparos.

US - APARELHO URINARIO

- Bexiga cheia.



TC CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros)...

TC PESCOÇO

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



TC TORAX

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

TC ABDOME TOTAL

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



TC ABDOME SUPERIOR

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;

- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

TC PELVE OU BACIA

- PARA EXAMES CONTRASTADOS;

- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



TC COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA DE CRÂNIO

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA DE PESCOÇO

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA DE TÓRAX

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA ABDOME SUPERIOR

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**

- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA DE PELVE

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**

- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA PULMONAR

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).

ANGIOTOMOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES ARTERIAL E VENOSA

- **PARA EXAMES CONTRASTADOS;**
- OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;
- Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;
- Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®) devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;
- Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;
- Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado;
- Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior."
- De preferência vir com vestuário confortável, não usar adornos (brinco, colares, entre outros).



DENSITOMETRIA ÓSSEA

Não ingerir medicamentos que contenham cálcio 24 horas antes do exame;
Não é necessário jejum;
Não realizar exames com contraste 24 horas antes do exame:
Trazer pedido médico e guia autorizada;
Evitar roupas com acessório de metal;

ECG – ELETROCARDIOGRAMA

As medicações de uso contínuo podem ser usadas normalmente;
Chegar com pelo menos 15 min de antecedência para repouso;
Não realizar exercício físico por 4 horas antes do exame;
Não portar no corpo objetos metálicos ou eletrônicos;
Não passar creme hidratante na região de tórax, punhos e tornozelos;
Realizar raspagem de pelos da região do tórax ou aparar os pelos;
Usar top esportivo ou sutiã sem arame;
De preferência vir com vestuário confortável de duas peças, evitar vestido;
Trazer por escrito os nomes das medicações de uso contínuo.

MAMOGRAFIA CONVENCIONAL BILATERAL

Não passar hidratante nas mamas nem desodorante nas axilas.
Trazer mamografia e exames anteriores.



UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRE E PÓS MICCIONAL

OBRIGATÓRIO LEVAR 1 ACOMPANHANTE;

Jejum de sólidos e líquidos por 6 horas;

Os clientes diabéticos em uso de medicamentos a base de CLORIDRATO DE METFORMINA (Glifage®, Glucofage®, Dimefor®, Glucoformin®, Neometformin®, Teutoformin® e Glucovange®)

devem solicitar autorização do seu médico para suspender o uso deste medicamento 48 horas antes e 48 horas após a realização do exame de Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso;

Se estiver tomando medicação, tomar normalmente, mas com pouca água - salvo em casos orientados pelo Radiologista;

Exame de creatinina. Apresentar exame de creatinina realizado em até 3 meses da data de realização do exame. Exames com data anterior a 3 meses, deve ser repetido e apresentado .

Trazer Tomografia Computadorizada, Raio-X ou Ressonância Magnética anterior.

VESPERA DO EXAME:

1. Almoço: SOPA

2. Às 16:00h: tomar 5 (cinco) comprimidos de DUCOLAX

40 gotas de LUFTAL, repetir as gotas de LUFTAL

3. Jantar: SOPA às 19:30h

Às 22:00h: tomar 40 gotas de LUFTAL

4. Jejum a partir das 22:00h (inclusive de água)

Às 04:00h: tomar 40 gotas de LUFTAL



URETROCISTOGRAFIA DE ADULTO

NÃO TEM PREPARO

URETROCISTOGRAFIA DE CRIANÇA (ATÉ 12 ANOS)

NÃO TEM PREPARO

