

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS

IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO:	SEXO: () M () F
CPF:	RG:
CONVÊNIO:	DATA DE NASCIMENTO:
QUARTO/LEITO:	
DIAGNÓSTICO:	
INDICAÇÃO CLÍNICA:	

ANTECEDENTES

TRANSFUSÃO () SIM () NÃO
REAÇÃO TRANSFUSIONAL () SIM () NÃO
GRAVIDEZ/ABORTO () SIM () NÃO
OBSERVAÇÕES:

RESULTADO DE EXAMES

Ht:	Hb:	CONTAGEM DE PLAQUETAS:
PA:	Pulso:	Peso:
Outros (TAP, TTPa)		

CARÁTER TRANSFUÇÃO

() PROGRAMADA/RESERVA/DATA:	
() ROTINA (transfundir em até 24 hs):	
() URGÊNCIA (transfundir em até 3 hs):	
() EMERGÊNCIA (transfusão imediata, risco de morte):	

SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE

PROCEDIMENTO ESPECIAL: Filtrado () Irradiado () Filtrado e Irradiado ()
JUSTIFICATIVA:

DATA: ___/___/___ LOCAL: _____

NOME: _____

CRM: _____ ASSINATURA: _____

Pela legislação vigente, deve haver um termo de consentimento esclarecido assinado pelo paciente/ médico para a transfusão.

RECEBIMENTO

TÉCNICO: _____
DATA: / /
HORA: _____

RESULTADO

ABO: _____	RhD: _____	PAI: _____
TÉCNICO: _____		
OBSERVAÇÕES: _____		

HEMOCOMPONENTES

ORIENTAÇÕES PARA TRANSFUÇÃO:

- Não colocar a bolsa em água quente, não perfurar ou injetar substâncias na bolsa, não infundir no mesmo acesso venoso concomitante com outros medicamentos ou soro glicosado, utilizar um equipo para cada transfusão, exceto em transfusão de crioprecipitado. Não retirar a etiqueta da bolsa;
- Conferir o nome completo do paciente com o nome na etiqueta da bolsa;
- Durante os 10 primeiros minutos da transfusão, o paciente deverá ser acompanhado de um profissional da saúde habilitado.

CH (concentrado de hemácias): não ultrapassar 4 horas de infusão.

CP (concentrado de plaquetas): infundir em 30 minutos. Não armazenar em refrigerador.

PFC (plasma fresco congelado): a transfusão deve ocorrer o quanto antes após o descongelamento. Uma vez descongelada, não congelar novamente.

CONDUTA FRENTE À REAÇÃO TRANSFUSIONAL IMEDIATA:

- Interromper a transfusão;
- Manter acesso venoso com soro fisiológico;
- Verificar à beira do leito se o hemocomponente foi transfundido ao paciente destinado (checar os rótulos, o pedido e a prescrição);
- Verificar os sinais vitais;
- Comunicar o médico assistente e/ou plantonista do horário;
- Comunicar à Agência Transfusional