

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ABEMACICLIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Abemaciclibe é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento humano epidérmico 2 negativo (HER2 negativo).

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, com ou sem alimento. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Pode causar diarreia, que pode ser grave em alguns casos. A diarreia pode levar à desidratação ou à uma infecção. O momento mais comum para se desenvolver diarreia é durante o primeiro mês do tratamento. Notifique seu médico ou profissional de saúde para instruções adicionais e acompanhamento apropriado. Aumente a ingestão de líquidos.

# ABEMACICLIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso você se esqueça de uma dose, você deverá tomá-la assim que lembrar. Se você se esquecer da dose durante um dia inteiro, pule a dose esquecida e tome apenas uma dose, como de costume, no dia seguinte. Não tome duas doses para compensar um comprimido esquecido

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Diarreia, náusea, vômito, infecções (no trato respiratório), disgeusia (alteração do paladar), pele seca, alopecia, erupção cutânea (feridas na pele), aumento da lacrimação e eventos tromboembólicos venosos, anemia. Além de diminuição de células sanguíneas. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ABIRATERONA

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático.

### **Como você deve usar este medicamento?**

Por via oral, ingeridos inteiros com água. Não deve ser tomado junto com alimentos. Deve ser tomado pelo menos 2 horas após a refeição e nenhum alimento deve ser ingerido durante pelo menos 1 hora após a ingestão. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Requer atenção caso o paciente apresente história de doença cardiovascular. Pode afetar o fígado. Os pacientes submetidos ao tratamento devem utilizar medidas contraceptivas para evitar gravidez em suas parceiras. Caso o paciente tenha relações sexuais com mulheres grávidas deve usar preservativo (camisinha).

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar a dose diária, você deve tomar a dose normal do dia seguinte. Se você se esquecer de tomar a dose diária por mais de um dia, converse com seu médico.

**Unimed**   
Caruaru

# ABIRATERONA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Procure atendimento médico se houver: fraqueza muscular, câimbras musculares e batidas rápidas ou irregulares de coração (sinais relacionados à perda de potássio). As reações adversas mais comuns são: inchaço nas pernas e pés, nível baixo de potássio no sangue, infecção urinária, pressão alta, indigestão (dispepsia), sangue na urina (hematúria) e risco de fraturas ósseas. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Comprimidos ovais, cor branca e quase branca, caso haja alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ACALABRUTINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) que receberam pelo menos uma terapia anterior, e para o tratamento de pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) / linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC).

### **Como você deve usar este medicamento?**

Deve ser engolido inteiro com água aproximadamente na mesma hora todos os dias. Pode ser tomado com ou sem alimento. A cápsula não deve ser mastigada, dissolvida ou aberta.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Casos de hemorragia podem ocorrer e por isso deve ser informado ao médico se estiver em uso de antitrombóticos, pois aumentam o risco de hemorragia. Se houver sinais e sintomas de hemorragia, como sangue nas fezes, vômito com sangue, tosse com sangue ou coágulos sanguíneos; tontura; fraqueza; confusão; mudanças na fala; e dor de cabeça que dure muito tempo, informar ao seu médico imediatamente. Há o risco de infecção, por isso, informar ao seu médico qualquer sinal de febre, arrepios e sintomas de gripe. Manter a consulta ao seu médico regular, para que ele possa solicitar os exames necessários de monitoramento.

**Unimed**   
Caruaru

# ACALABRUTINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar uma cápsula por mais de 3 horas, você deverá tomar apenas a próxima dose programada em seu horário habitual. Não se deve tomar cápsulas adicionais do medicamento para compensar a dose.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

As reações mais comuns são: infecção, diarreia, náuseas, fadiga (cansaço), constipação (prisão de ventre), vômito, dor abdominal, dor de cabeça, tontura, contusão, equimose (manchas vermelho-arroxeadas na pele), erupção cutânea, hemorragia, hematoma, dor muscular e nos ossos, artralgia (dor nas articulações), leucopenia (redução do número de leucócitos no sangue), novas neoplasias malignas primárias (novos tumores malignos não existentes anteriormente), anormalidades laboratoriais (exames de sangue): diminuição da contagem absoluta de neutrófilos, diminuição da hemoglobina (anemia), diminuição das plaquetas.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, por favor, devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ALECTINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de pacientes com câncer de pulmão do tipo de “não pequenas células”, que esteja localmente avançado ou metastático e que seja ALK positivo.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, tomar com alimentos, deve engolir as cápsulas inteiras e não deve abri-las nem as dissolver (misturadas com qualquer líquido).

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Casos de inflamação nos pulmões podem ocorrer durante o uso de desse medicamento Seu médico deve ficar atento para sintomas pulmonares que você possa apresentar. Além disso pode ocorrer mialgia grave (dor muscular) e elevação de creatina fosfoquinase (uma enzima dos músculos) Se você apresentar dor, sensibilidade ou fraqueza muscular não explicada informe ao seu médico.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se uma dose programada do medicamento for esquecida, você deverá tomar esta dose, desde que a dose seguinte seja dentro das próximas 6 horas. Se você apresentar vômitos depois de tomar uma dose deste medicamento, então você deverá tomar a dose seguinte no horário agendado.

**Unimed**   
Caruaru

# ALECTINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Constipação, enjoos, diarreia e vômitos, aftas, distorção do paladar, edema (inchaço), dor muscular, manchas vermelhas e irritação à exposição ao sol, anemia, distúrbios da visão (fotossensibilidade), e bradicardia (redução dos batimentos do coração). Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e deve ser mantido dentro do cartucho para proteger da luz e umidade.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico

## Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ALPELISIBE

### Para que este medicamento é indicado?

É usado para o tratamento de pacientes com um tipo de câncer de mama chamado de câncer de mama avançado ou que tenha se espalhado para outras partes do corpo (metastático), positivo para o receptor hormonal (RH) e negativo para o receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2).

### Como você deve usar este medicamento?

Os comprimidos devem ser engolidos inteiros (eles não devem ser mastigados, esmagados nem cortados antes de serem engolidos). Você não deve engolir nenhum comprimido que esteja quebrado, rachado ou que de outra forma não esteja intacto. Tomar no mesmo horário todos os dias ajudará você a se lembrar de quando deve tomar o medicamento. E sempre imediatamente após a refeição. Se vomitar após engolir os comprimidos, não tome mais comprimidos até a sua próxima dose programada.

### O que devo saber antes de usar este medicamento?

Este medicamento pode causar alguns efeitos adversos ou colaterais durante o tratamento, e por isso, é possível que o seu médico queira ajustar a sua dose para uma dose mais baixa, deixar de tomar uma dose ou descontinuar o tratamento caso necessário. Manter as consultas atualizadas com o seu médico, porque ele vai monitorar regularmente sua saúde para verificar se o tratamento está tendo o efeito desejado.

**Unimed**   
Caruaru

# ALPELISIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se houver esquecimento da dose diária, você ainda poderá tomá-la, imediatamente após uma refeição, até 9 horas após o horário quando deveria ter tomado. Se só se lembrar mais de 9 horas após o horário em que deveria ter tomado, pule a dose daquele dia. No dia seguinte, tome a dose no horário habitual. Não tome uma dose dupla para compensar a dose esquecida.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode causar?

Aumento de glicose no sangue, micção dolorosa e frequente; cansaço, palidez, perda de apetite, dor de cabeça (cefaleia), gosto estranho na boca (disgeusia), náusea, vômito, lesões ou úlceras orais com inflamação da gengiva, dor abdominal, dor de estômago, indigestão (dispepsia), erupção cutânea, queda ou afinamento dos cabelos (alopecia), coceira (prurido), pele seca.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024  
Data de revisão: 05/05/2025

## ANASTROZOL

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Contém lactose. Não é indicado o uso em crianças ou em mulheres na pré-menopausa. Por diminuir os níveis de estrógeno no sangue, pode causar redução da densidade mineral óssea, aumentando o risco de fraturas. Não deve ser utilizados por mulheres grávidas ou que possam engravidar durante o tratamento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Apenas retorne ao tratamento habitual.

**Unimed**   
Caruaru

# ANASTROZOL

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Ondas de calor, fraqueza, dor nas articulações, dores de cabeça, náusea e lesões na pele com vermelhidão são as reações mais comuns. Na ocorrência destes eventos comunique ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Os comprimidos são brancos e redondos, se houver alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## APALUTAMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento de pacientes com câncer de próstata que não se espalhou para outras partes do corpo, após falha à terapia de privação de androgênios (um hormônio sexual).

### **Como devo usar este medicamento?**

A dose recomendada é de 240mg (4 comprimidos de 60mg) administrados via oral 1 vez ao dia. Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros com ou sem alimento. Tome uma vez ao dia, todos os dias, aproximadamente no mesmo horário. É importante tomar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, de modo que a quantidade de apalutamida se mantenha estável no sangue.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Quedas e fraturas ocorreram em pacientes que receberam esse medicamento. Seu médico irá realizar uma avaliação quanto ao risco de fratura e queda e a necessidade do uso de agentes inibidores da reabsorção óssea.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer uma dose, tome o mais rápido possível no mesmo dia com um retorno ao horário normal no dia seguinte. Você não deve tomar comprimidos extras para compensar a dose perdida.

**Unimed**   
Caruaru

# APALUTAMIDA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Diminuição do apetite, edema periférico, erupção cutânea, fratura, artralgia (dor articular), fadiga (cansaço), perda de peso, queda, hipertensão, ondas de calor, diarreia e náuseas. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz. Manter os comprimidos em embalagem original.

## **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se uma dose programada do medicamento for esquecida, você deverá tomar esta dose, desde que a dose seguinte seja dentro das próximas 6 horas. Se você apresentar vômitos depois de tomar uma dose deste medicamento, então você deverá tomar a dose seguinte no horário agendado.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## BARICITINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Utilizado em monoterapia ou em combinação com metotrexato (MTX) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave com resposta inadequada ou intolerância a um ou mais antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs não biológicos e biológicos).

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, com ou sem alimento, e seu uso deve ser contínuo, interrompido somente sob orientação médica. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

O tratamento pode ser associado com um aumento da taxa de infecções, como infecções do trato respiratório superior e não deve ser administrado a pacientes com tuberculose ativa (TB). Além disso caso o paciente desenvolva herpes zoster (erupção cutânea com bolhas causada pelo vírus varicela-zoster), o tratamento deve ser interrompido até que o episódio se resolva. Fale com o seu médico se tiver uma erupção cutânea com bolhas durante o tratamento, pois pode ser sinal de herpes.

**Unimed**   
Caruaru

# BARICITINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso você se esqueça de uma dose, você deverá tomá-la assim que lembrar. Se você se esquecer da dose durante um dia inteiro, pule a dose esquecida e tome apenas uma dose, como de costume, no dia seguinte. Não tome duas doses para compensar um comprimido esquecido.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Infecções do trato respiratório superior, náuseas, infecções do trato urinário, herpes simples, gastroenterite, neutropenia, trombocitose. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 a 30°C) e em sua embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## BICALUTAMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Indicado no tratamento de câncer de próstata.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, deve ser tomado com água. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Deve ser utilizado com cautela em pacientes com histórico de alterações hepáticas. Os pacientes e/ou suas parceiras devem seguir adequada contracepção durante e por 130 dias após o tratamento. Risco de sangramento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar uma dose, você deve tomar a dose normal do dia seguinte.

### **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Anemia, tontura, ondas de calor, dor abdominal, constipação, náusea, sangue na urina, dores nas mamas e ginecomastia, astenia e edema. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

**Unimed**   
Caruaru

# BICALUTAMIDA

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Comprimidos circular, biconvexo, de revestimento branco, caso haja alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Não é recomendado que você tome doses duplas em um mesmo dia para compensar doses esquecidas. Continue a tomar o medicamento no horário habitual. Não é necessário prorrogar o tratamento por esquecimento de uma dose.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## CABOZANTINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento do carcinoma de células renais avançado (CCR), um tipo de câncer dos rins: em adultos não tratados com risco intermediário ou alto segundo critérios clínicos; em adultos que fizeram tratamento anterior com inibidor do receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF).

### **Como você deve usar este medicamento?**

Você não deve tomar com alimentos; você não deve comer nenhum alimento nas duas horas antes de tomar o Cabozantinibe, nem durante uma hora após a sua ingestão. O consumo de toranja (grapefruit) ou de produtos que a contenha deve ser evitado enquanto estiver usando este medicamento (eles podem aumentar os níveis do medicamento no seu sangue). Os comprimidos devem ser engolidos inteiros.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Informe ao seu médico se alguma destas condições se aplicam a você: tiver pressão arterial elevada; ter ou tiver tido um aneurisma (dilatação e enfraquecimento da parede dos vasos sanguíneos) ou uma laceração na parede do vaso sanguíneo; tiver diarreia; tiver um histórico recente de hemorragia significativa; foi submetido a uma cirurgia há menos de um mês, ou se estiverem planejados procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia dentária; tiver doença intestinal inflamatória (por exemplo doença de Crohn ou colite ulcerosa, diverticulite ou apendicite); tiver um histórico recente de coágulo sanguíneo na perna, AVC ou ataque cardíaco; tiver doença hepática ou renal; tiver planos de engravidar ou amamentar. É possível que necessite de tratamento para estas condições ou o seu médico pode optar por alterar a sua dose de Cabozantinibe.

**Unimed**   
Caruaru

# CABOZANTINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você se esquecer de tomar o medicamento e ainda houver 12 horas ou mais antes da sua próxima dose, tome a dose perdida assim que você se lembrar. E então tome a próxima dose no tempo normal. No entanto, se a sua próxima dose for em período menor que 12 horas, não tome a dose que você perdeu. Tome somente sua próxima dose no tempo normal.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Efeitos mais comuns: Neuropatia periférica (incluindo a sensorial), dor na parte superior do estômago, dor de cabeça, tonturas, aumento da pressão arterial (hipertensão), hemorragia, dispneia, enfraquecimento da voz, tosse, dor abdominal, desconforto digestivo, diarreia, estomatite, náusea, vômito, constipação, dor na boca, boca seca, síndrome mão-pé, dermatite acneiforme, erupção na pele (maculopapular), pele seca, perda de cabelo, mudança de cor do cabelo, dor nas articulações, dor nas extremidades, espasmos musculares, perda de proteína na urina e fadiga.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor, devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## CAPECITABINA

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento de câncer de mama metastático, câncer colorretal, câncer gástrico.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir com água, 30 minutos após as refeições. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Contém lactose. Pode provocar secura na boca, flatulência e induzir diarreia, que pode ser grave. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam engravidar durante o tratamento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Caso esqueça-se de tomar uma dose, não tome uma dose extra. Pule a dose esquecida e aguarde o próximo horário e tome a sua dose normal em seguida.

**Unimed**   
Caruaru

# CAPECITABINA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Anorexia, cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, síndrome mão-pé (formigamento, que se tornam dormentes, dolorosos, inchados ou avermelhados), queda de cabelo, candidíase oral.

Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Os comprimidos são das seguintes cores: 150 mg cor pêssego claro e 500 mg cor pêssego, caso haja alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar. Os medicamentos não devem ser descartados no esgoto, e o descarte em lixo doméstico deve ser evitado.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## CICLOSPORINA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Se você sofre de alguma doença onde as células do seu sistema de defesa atacam o seu próprio organismo (doenças autoimunes) este medicamento é indicado para suprimir as imunorreações nestas doenças. Também utilizado por pacientes transplantados.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. É importante que você tome as doses na mesma hora todos os dias, sua dose diária deve sempre ser dividida em duas doses.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Os medicamentos que suprimem o sistema imune podem influenciar na capacidade do seu organismo de se defender contra infecções e pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, particularmente de pele e sistema linfóide. Portanto, você deve limitar sua exposição à luz solar e à luz UV vestindo roupas de proteção apropriada e aplicar filtro solar com alto fator de proteção. Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose e afetar a capacidade do seu organismo de combater infecções.

**Unimed**   
Caruaru

# CICLOSPORINA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar a dose, tome-a logo que você se lembrar, a menos que esteja quase na hora da próxima dose. Tome-a o quanto antes.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Problemas renais, pressão arterial alta, dor de cabeça, tremor e aumento do nível de lipídeos (por exemplo, colesterol) no sangue, dormência ou formigamento, perda de apetite, se sentir doente, dor no estômago, diarreia, gengiva inchada, problemas no fígado, alto nível de ácido úrico ou potássio no sangue, baixo nível de magnésio no sangue, dor muscular ou cãibra, fadiga. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## CLORAMBUCILA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento das seguintes condições: Doença de Hodgkin; certas formas de Linfoma não-Hodgkin; Leucemia linfocítica crônica; Macroglobulinemia de Waldenström.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Deve ser tomado com o estômago vazio (pelo menos uma hora antes ou três horas após as refeições).

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Enquanto você estiver fazendo uso deste medicamento, seu médico irá solicitar exames de sangue (hemogramas) para cuidadosa monitoração/acompanhamento. Isso servirá para checar a contagem de células e outros elementos sanguíneos e saber se a dose precisa ou não ser alterada.

**Unimed**   
Caruaru

# CLORAMBUCILA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso você se esqueça de tomar uma dose, avise seu médico. Não dobre sua próxima dose.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Perturbações gastrintestinais como enjoos, vômitos, diarreia e aftas; formas secundárias de câncer no sangue (especialmente leucemia e síndrome mielodisplásica); anemia; reações alérgicas como urticária e edema angioneurótico; hepatotoxicidade e icterícia. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Deve ser mantido em sua embalagem original e sob refrigeração (entre 2°C e 8°C).

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## DAROLUTAMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

É utilizado para tratar câncer de próstata que não se espalhou para outras partes do corpo.

### **Como você deve usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir os comprimidos inteiros, junto com alimento. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

O uso deste medicamento não é recomendado se você tiver insuficiência hepática moderada ou grave, seu médico pode precisar reduzir a dose. Sempre informe ao seu médico se você estiver tomando ou tomou recentemente qualquer outro medicamento, inclusive medicamentos isentos de prescrição médica.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer de tomar o darolutamida, tome a dose esquecida assim que você se lembrar, antes da próxima dose. Não tome duas doses para compensar a dose esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# DAROLUTAMIDA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

As reações adversas mais comuns relatadas são: fadiga (cansaço), rash (erupção cutânea), dor nas extremidades (dor nos braços e pernas). Reações que podem aparecer em exames de sangue: diminuição da contagem de neutrófilos, aumento da bilirrubina, aumento de aspartato transaminase.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Mantenha o frasco hermeticamente fechado após primeira abertura. Uma vez aberto, o medicamento demonstrou ser estável por 3 meses.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## DASATINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphia-positivo (LMC Ph+) na fase crônica recém diagnosticada. Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphia-positivo (LMC Ph+), que não estão mais se beneficiando com terapia anterior. Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossomo Philadelphia-positivo (LLA Ph+), que não estão mais se beneficiando com terapia anterior.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Pode ser tomado junto ou não com a alimentação, pela manhã ou pela noite. Procure tomar na mesma hora todos os dias. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Requer atenção caso o paciente apresente história de alteração renal grave MUDAR

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer de tomar uma dose do medicamento, tome a próxima dose no horário marcado. Não tome duas doses ao mesmo tempo.

**Unimed**   
Caruaru

# DASATINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, cansaço, febre, edema periférico, edema facial, vermelhidão, coceira, queda de cabelo, falta de ar, pneumonite (inflamação do pulmão), dor de cabeça, dor muscular, aumento ou diminuição de peso, diminuição do número de células sanguíneas. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter na embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## DEFERASIROX

### **Para que este medicamento é indicado?**

É utilizado para tratar a sobrecarga de ferro causada por transfusões de sangue, desta forma, reduzindo o risco da ocorrência de danos nos órgãos.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água uma vez ao dia, todos os dias, aproximadamente no mesmo horário. Tomar seus comprimidos com o estômago vazio, ou seja, pelo menos 30 minutos antes de ingerir qualquer alimento. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Seu médico deverá solicitar exames regulares (de sangue, urina) antes e durante o tratamento para monitorar a quantidade de ferro em seu organismo. Os antiácidos (medicamentos usados para tratar azia ou queimação) contendo alumínio não devem ser tomados durante o tratamento com deferasirox.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer de tomar uma dose, tome-a no dia e assim que você se lembrar. Tome a próxima dose como de costume. Não tome uma dose dobrada no dia seguinte para completar os comprimidos que faltaram.

**Unimed**   
Caruaru

# DEFERASIROX

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Distúrbios gastrintestinais, tais como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, constipação, indigestão; erupção cutânea (rash); dor de cabeça.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer de tomar uma dose de venetoclax no período de 8 horas do horário em que normalmente toma o medicamento, deverá tomá-la o quanto antes, retomando o tratamento. Se você se esquecer de tomar uma dose por mais de 8 horas do horário em que normalmente toma o medicamento, a dose esquecida NÃO deverá ser tomada, retomando o esquema de administração no dia seguinte. Se você vomitar após a tomada da dose, não tomar uma dose adicional.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação. .

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico

## Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ELTROBOMPAGUE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de plaquetopenia em pacientes adultos e pediátricos acima de 6 anos com púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) de origem imune, os quais tiveram resposta insuficiente a corticosteroides, imunoglobulinas ou esplenectomia (retirada do baço). Indicado em combinação com terapia imunossupressora padrão para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos e pediátricos acima de 6 anos com Anemia Aplásica Severa (AAS).

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Deve ser ingerido pelo menos duas horas antes ou quatro horas depois de quaisquer produtos, como antiácidos (remédios para digestão/estômago), laticínios (leite, queijos, manteiga) ou suplementos minerais, que contenham cátions polivalentes (por exemplo: alumínio, cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco). Pode ser ingerido com alimentos que contém pouco (<50 mg) ou, de preferência, nenhum cálcio.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Há risco de alteração nos exames de sangue que avaliam a função do fígado, e medem a toxicidade e a lesão no fígado; complicações trombóticas e tromboembólicas; sangramento após a suspensão de tratamento; progressão de malignidades hematológicas existentes; catarata. Exames de sangue serão solicitados com frequência pelo seu médico.

**Unimed**   
Caruaru

# ELTROBOMPAGUE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar o medicamento, NÃO tome uma dose duplicada para repor a que foi esquecida. Apenas siga com o tratamento, tomando-o normalmente no dia seguinte.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Dor nas costas. Coágulos de sangue (eventos tromboembólicos); sensação de enjoo (náusea); diarreia; cristalino opaco nos olhos (catarata); olhos secos; perda de cabelo ou enfraquecimento não usuais; manchas na pele; coceira; dor muscular, espasmos musculares; dor nos ossos; formigamento ou dormência das mãos ou pés; feridas (aftas) na boca. Ciclo ou período menstrual intenso. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## ENZALUTAMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Para tratar homens com câncer de próstata.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, uma vez ao dia, ingerir inteiro com água. Pode ser tomado com ou sem alimento. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Requer atenção caso o paciente apresente histórico de alterações hepáticas, renais e de convulsões. Pode afetar a fertilidade masculina. Os pacientes submetidos ao tratamento devem utilizar medidas contraceptivas para evitar gravidez em suas parceiras durante e até três meses, após o tratamento. Caso o paciente tenha relações sexuais com mulheres grávidas deve usar preservativo (camisinha).

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar uma dose e lembrar ao longo do dia, tome a dose esquecida e siga normalmente o tratamento. Caso não lembre no mesmo dia, pule a dose esquecida, não tome doses duplas para compensar a dose perdida e continue normalmente o tratamento.

**Unimed**   
Caruaru

# ENZALUTAMIDA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Convulsões, fadiga, dor de cabeça, ondas de calor, pele seca, aumentos das mamas em homens, síndrome das pernas inquietas, quedas e fraturas são algumas reações comuns durante o uso deste medicamento. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C) e proteger da umidade. Manter os comprimidos na embalagem original. Cápsulas gelatinosas moles, ovais, de cor branca a quase branco, caso haja alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar. Os medicamentos não devem ser descartados no esgoto, e o descarte em lixo doméstico deve ser evitado.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico

## Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## EVEROLIMO

### **Para que este medicamento é indicado?**

Mulheres na pós-menopausa com câncer de mama avançado; Tumores neuroendócrinos avançados localizados no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas; Câncer avançado dos rins.

### **Como devo usar este medicamento?**

Devem ser ingeridos por via oral, você deve tomar todos os dias no mesmo horário, regularmente, com ou sem alimentação. Engula os comprimidos inteiros com um copo de água. Não mastigue ou triture os comprimidos.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Se algum destes casos for aplicável, avise seu médico antes de tomar o medicamento se você: tiver qualquer problema no fígado ou tiver tido anteriormente quaisquer doenças que possam tê-lo afetado, tiver diabetes ou quaisquer infecções, tiver tido hepatite B anteriormente, porque ela pode ser reativada durante o tratamento, caso esteja grávida ou amamentando e caso você tenha se programado para receber qualquer vacina.

**Unimed**   
Caruaru

# EVEROLIMO

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar a medicação, você ainda pode tomá-lo até 6 horas depois do horário habitual. Se você se lembrar de tomar mais de 6 horas depois do horário que você toma normalmente, pule a dose daquele dia. No dia seguinte, tome o comprimido no horário habitual. Não tome uma dose dobrada para compensar aquela que você esqueceu.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Sinais de infecção com aumento da temperatura ou calafrios. Fadiga, perda do apetite, náusea, icterícia (amarelamento da pele), ou dor na parte superior direita do abdômen, fezes pálidas ou urina escura (pode também ser sinal de reativação da Hepatite B). Febre, tosse, dificuldade de respirar, respiração ofegante, sinais de inflamação do pulmão (pneumonite).

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz e umidade. Manter os comprimidos em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## EXEMESTANO

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Não deve ser utilizado juntamente com medicamentos que contêm estrógenos (hormônio feminino), pelo risco de anular sua atividade. Requer atenção caso o paciente apresente histórico de osteoporose ou fraturas dos ossos, pois pode causar diminuição da densidade mineral óssea.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Caso você esqueça-se de tomar exemestano no horário estabelecido, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses. Não tome uma dose adicional para compensar a esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# EXEMESTANO

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

As reações adversas mais frequentemente relatadas incluíram rubor (vermelhidão), artralgia (dor nas articulações), fadiga (cansaço) e náusea (enjoo). Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## FLUTAMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de pacientes com câncer de próstata.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir com água. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Contém lactose. Requer atenção caso o paciente apresente história de alterações hepáticas. Este medicamento somente é indicado para pacientes do sexo masculino.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

No caso de esquecimento de alguma dose, tome o medicamento assim que possível e mantenha este mesmo horário de ingestão até o término do tratamento. Não tome uma dose adicional para compensar a esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# FLUTAMIDA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Ginecomastia (aumento do tecido mamário), aumento da sensibilidade mamaria, saída de leite das mamas.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Comprimido circular de coloração amarela, caso haja alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## GEFITINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não-pequenas células localmente avançado ou metastático.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, podendo ser administrado com ou sem a ingestão de alimentos, de preferência no mesmo horário todos os dias. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Requer atenção caso o paciente apresente alteração na função hepática grave. Os pacientes devem procurar orientação médica caso ocorra diarreia grave ou persistente, náusea, vômito ou anorexia. Este medicamento contém lactose.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se uma dose for esquecida, o paciente deve tomá-la assim que se lembrar. Se faltar menos de 12 horas para a próxima dose, o paciente não deve tomar a dose esquecida. O paciente não deve tomar doses dobradas (duas doses ao mesmo tempo) para compensar uma dose esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# GEFITINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

As reações adversas mais frequentemente relatadas, são diarreia e alterações na pele (incluindo rash, acne, pele seca e prurido), náusea, vômito, desidratação. Normalmente ocorrem nos primeiros meses do tratamento e são, geralmente, reversíveis.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024  
Data de revisão: 05/05/2025

## HIDROXIUREIA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de leucemia (câncer de origem na medula óssea) mielocítica crônica resistente e melanoma (tumor maligno que deriva do melanócito – célula que produz a melanina). Combinado com radioterapia, é também indicado para o tratamento de câncer de células escamosas primárias de cabeça e pescoço (com exceção dos lábios) e câncer de colo uterino.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Procure tomar na mesma hora todos os dias.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Durante o tratamento você deve manter uma ingestão adequada de líquidos, se você apresentar problemas nos rins, informe seu médico. A anemia grave deve ser corrigida antes do início do tratamento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Apenas retorne ao tratamento habitual.

**Unimed**   
Caruaru

# HIDROXIUREIA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Estomatite (inflamação da mucosa oral), anorexia, náusea, vômitos, diarreia e constipação. Depressão da medula óssea (leucopenia, anemia e trombocitopenia). Aparecimento de manchas avermelhadas na pele, eritema facial, eritema periférico, ulceração da pele. Sonolência; raros casos de dor de cabeça, tontura, desorientação. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter na embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

**81 2103-5000 - Ramal: 2357**

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

**9h às 15h**

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## IBRUTINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de Linfoma de Célula do Manto (LCM), Leucemia linfocítica crônica (LLC), incluindo Linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC), Macroglobulinemia de Waldenström, um tipo de câncer que afeta as células brancas do sangue, Linfoma de Zona Marginal (LZM), Doença do enxerto contra hospedeiro crônica (DECHc), uma condição em que as células transplantadas de outra pessoa (o doador) atacam o corpo (o hospedeiro) causando danos aos órgãos.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, no mesmo horário todos os dias. Pode ser tomado antes ou após uma refeição. Não quebre, mastigue ou abra as cápsulas.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Este medicamento pode aumentar o risco de sangramento, avise ao seu médico caso planeje passar por alguma cirurgia. Podem ocorrer casos de reativação da hepatite B. Você pode sentir fadiga (cansaço) ou tontura e astenia (ausência ou diminuição da força física) tomando este medicamento e isso pode afetar sua capacidade para dirigir, usar qualquer ferramenta e operar máquinas. Não engravide ou amamente durante o tratamento.

**Unimed**   
Caruaru

# IBRUTINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar uma dose, esta dose pode ser tomada assim que possível no mesmo dia, com o retorno ao esquema normal no dia seguinte. Não tome doses extras para compensar a dose esquecida.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Pneumonia; infecção do trato respiratório superior; sinusite; infecção de pele; dor de cabeça; hemorragia; hematoma; diarreia; vômito; aftas na boca e/ou garganta; náusea; constipação; erupção cutânea; dor articular; espasmos musculares; dor musculoesquelética; febre; edema periférico (mãos, tornozelos e pés inchados). Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C)

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## IMATINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide crônica (LMC), tratamento de pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda (LLA Ph+), tratamento de pacientes adultos com tumores estromais gastrintestinais (GIST), não-ressecáveis e/ou metastáticos e tratamento adjuvante de pacientes adultos após ressecção de GIST primário.

### **Como devo usar este medicamento?**

A dose prescrita deve ser tomada oralmente, durante uma refeição para ajudar a proteger seu estômago. Engula o(s) comprimido(s) inteiro(s) junto com um copo grande de água.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Durante a terapia com imatinibe, devem ser realizados regularmente exames de sangue para contagens sanguíneas completas. Da mesma forma, a função hepática deve ser monitorizada regularmente. Seu médico irá monitorar regularmente suas condições para verificar se o medicamento está tendo o efeito desejado.

**Unimed**   
Caruaru

# IMATINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso você esqueça uma dose, tome-a logo que se lembrar, a menos que já esteja muito próximo da próxima dose. Não tome uma dose dobrada para compensar a dose esquecida.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Rápido aumento de peso, inchaço das extremidades (panturrilhas, tornozelos), inchaço generalizado como inchaço na face (sinais de retenção de água); Fraqueza, sangramento ou contusão espontâneos, infecções frequentes com sinais como febre, calafrios, dor de garganta, úlceras na boca (sinais de baixo nível de células sanguíneas). Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz e umidade. Manter os comprimidos em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas,

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## LAPATINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de câncer de mama metastático com superexpressão de HER2 e câncer de mama metastático hormônio sensível.

### **Como você deve usar este medicamento?**

Deve ser tomado com o estômago vazio, isto é, no mínimo 1 hora antes ou 1 hora depois de uma refeição. Tome a dose usual no mesmo horário, sempre tomar no mesmo horário todos os dias o ajudará a se lembrar de quando tomar o seu medicamento. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros com um copo de água. A dose diária recomendada não deve ser dividida. Se você estiver tomando outro medicamento para tratar seu câncer de mama junto com Lapatinibe, siga as instruções do seu médico sobre como tomar esse medicamento. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Se você tiver problemas no coração, no pulmão ou no fígado ou se você tiver episódios graves de diarreia ou reações cutâneas durante o tratamento, seu médico poderá solicitar a redução da dose ou até a interrupção temporária do tratamento. Por isso, informe ao seu médico imediatamente se sintomas surgirem durante o tratamento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se houver esquecimento, não use uma dose duplicada para repor a dose esquecida. Apenas siga com o tratamento, tomando normalmente a medicação no dia seguinte.

**Unimed**   
Caruaru

# LAPATINIBE

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Febre, dor de garganta, infecções frequentes como sinais de níveis baixos de glóbulos brancos (leucopenia); Pele pálida, fraqueza, infecções frequentes com febre, calafrios e dor de garganta como sinais de níveis baixos de glóbulos vermelhos (anemia); uma reação ou dor nas palmas das mãos ou solas dos pés, incluindo formigamento, dormência, dor, inchaço ou vermelhidão (síndrome eritrodisestesia palmo-plantar ou síndrome mão-pé); dores abdominais perda de apetite (anorexia); indigestão ou dor de estômago (dispepsia); sentir-se doente (náusea ou vômito); contusão; cansaço (fadiga); perda ou queda de cabelo (alopecia); sangramento nasal (epistaxe); feridas ou úlceras na boca (inflamação da mucosa);

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor, devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## LENALIDOMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de pacientes com mieloma múltiplo, câncer que afeta um determinado tipo de glóbulos brancos chamados células plasmáticas. Tratamento de pacientes com síndrome mielodisplásica onde parte do cromossomo 5 é ausente (deleção 5q), com ou sem outras anormalidades citogenéticas.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, praticamente no mesmo horário todos os dias, com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Lenalidomida é um análogo químico da talidomida, um conhecido agente teratogênico humano, ou seja, que provoca malformações no feto tais como ausência e/ou malformação grave nos braços e nas pernas. Este medicamento foi prescrito somente para você, nunca compartilhe com ninguém isto pode ser perigoso. Devolva todas as cápsulas não utilizadas. Este medicamento contém LACTOSE.

**Unimed**   
Caruaru

# LENALIDOMIDA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se menos de 12 horas decorrerem desde uma dose esquecida, você pode tomar a dose normalmente. Se mais de 12 horas se passarem desde uma dose esquecida no horário normal, você não deve mais tomar essa dose, mas sim tomar a próxima dose no horário normal no dia seguinte. Não tome uma dose em dobro para compensar uma dose esquecida. Avise ao seu médico sobre o ocorrido.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Fraqueza, inchaço nos pés e mãos, sintomas relacionados a gripe (incluindo febre, tosse, dor de garganta, dor muscular, dor no corpo, dor de cabeça), diarreia, dor na barriga, náusea, vômito, prisão de ventre, dores musculares, tontura, sangramento nasal, tosse, pneumonia e infecção do trato urinário, lesões na pele, coceira, pele seca, diminuição do número de células sanguíneas, apetite reduzido e insônia.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 240952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024  
Data de revisão: 05/05/2025

## LENVATINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

É utilizado para tratamento de pacientes adultos com um tipo de câncer de tireoide localmente avançado ou metastático e carcinoma hepatocelular (câncer de fígado). Também utilizado para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais avançado (CCR).

### **Como você deve usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Pode ser tomado com ou sem alimentos. Tomar no mesmo horário todos os dias. As cápsulas não devem ser abertas e deve-se evitar a exposição direta ao seu conteúdo. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

O seu médico pode realizar alguns exames de sangue, por exemplo, verificar sua pressão arterial, a função do fígado ou do rim e ver se você tem baixos níveis de sal e altos níveis de hormônio estimulante da tireoide no sangue, e então discutir os resultados desses testes com você e decidir se você pode receber o medicamento.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se faltar 12 horas ou mais até a próxima dose: tome a dose esquecida assim que se lembrar. Em seguida, tome a próxima dose no horário normal. Se faltar menos de 12 horas até a próxima dose: pule a dose esquecida. Em seguida, tome a próxima dose no horário normal. Não tome uma dose dobrada (duas doses ao mesmo tempo) para compensar a dose esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# LENVATINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Perda de apetite ou perda de peso. Náusea, vômito, constipação, diarreia, dor abdominal, indigestão. Sensação de muito cansaço ou fraqueza. Inchaço nas pernas. Erupção cutânea. Boca seca e inflamada. Inchaço e inflamação das articulações (juntas); e músculos, ossos e juntas rígidas (duras). Tontura. Perda de cabelo. Sangramentos nasais, mas pode incluir sangramento de outros locais como na urina. Problemas para dormir. Dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor nas costas. Alterações nos resultados de exames sanguíneos.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original, protegido da umidade.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

**81 2103-5000 - Ramal: 2357**

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

**9h às 15h**

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## LETROZOL

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Requer atenção caso o paciente apresente história de alteração renal grave, alteração hepática grave, histórico de osteoporose ou fraturas dos ossos.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Apenas retorne ao tratamento habitual.

**Unimed**   
Caruaru

# LETROZOL

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Ondas de calor, perda de cabelo e sangramento vaginal, aumento do colesterol, aumento da transpiração e ressecamento da pele. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Comprimido revestido, amarelo, circular, liso dos dois lados, se houver alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## MERCAPTOPURINA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Leucemia aguda e leucemia granulocítica crônica em adultos e crianças.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Lavar e secar as mãos antes do manuseio. Abrir cuidadosamente a embalagem sobre uma superfície (ex.: guardanapo) evitando o contato das mãos com os comprimidos, utilizar preferencialmente uma colher para levar o comprimido à boca. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Lavar as mãos após o uso.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Converse com o seu médico antes de tomar qualquer vacina, pacientes imunodeprimidos podem ter infecções quando imunizados por vacinas contendo vírus vivos. Pode ativar focos primários de tuberculose. O tratamento diminui o número de algumas células do sangue como hemácias, leucócitos e plaquetas. Requer atenção caso o paciente apresente história de alteração renal e hepática.

**Unimed**   
Caruaru

# MERCAPTOPURINA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Não é recomendado que você tome doses duplas em um mesmo dia para compensar doses esquecidas. Continue a tomar o medicamento no horário habitual. Não é necessário prorrogar o tratamento por esquecimento de uma dose.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Redução do funcionamento da medula óssea, diminuição do número de leucócitos, diminuição do número de plaquetas, enjoo, vômito, pancreatite e problemas no fígado. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original. Comprimidos redondos, de cor amarela clara, se houver alguma alteração visível, consulte o farmacêutico da unidade de dispensação antes de tomar.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## NILOTINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide crônica cromossomo Philadelphia positivo (LMC Ph+) em fase crônica (FC) recém-diagnosticada; Tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide crônica cromossomo Philadelphia positivo (LMC Ph+) em fase crônica (FC) ou em fase acelerada após falha ou intolerância a pelo menos uma terapia prévia.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, deve ser tomado duas vezes ao dia, em intervalos de 12 horas, aproximadamente, e não deve ser ingerido com alimentos. Nenhum alimento deve ser consumido por, pelo menos, duas horas antes da dose ser ingerida, e uma hora após a ingestão da dose.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Não ingerir com alimentos. Não comer ou beber produtos e sucos contendo grapefruit (toranja), carambola, romã, laranjas de Seville e outras frutas similares durante o tratamento. Não engravidar ou amamentar. Avise seu médico imediatamente, ou assim que possível, se você desmaiar (perder a consciência) ou tiver batimentos cardíacos irregulares enquanto estiver em tratamento.

**Unimed**   
Caruaru

# NILOTINIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você esquecer de tomar uma dose, tome a próxima dose como de costume. Não tome uma dose dobrada para completar os comprimidos que faltaram.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Dor abdominal, náusea, vômito; constipação (intestino preso), diarreia; dor de cabeça; cansaço, falta de energia; dor muscular, dor nas articulações; prurido, rash (erupção cutânea), pele seca, urticária; queda de cabelo. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Você deve armazenar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C) e na sua embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## OLAPARIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de câncer de ovário, câncer de mama, adenocarcinoma de pâncreas e câncer de próstata.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Foram relatadas alterações de componentes do sangue em pacientes tratados com olaparibe, incluindo diagnósticos clínicos e/ou resultados laboratoriais, em geral, anemia, diminuição de glóbulos brancos e plaquetas, de forma leve à moderada.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se por alguma razão você se esquecer de tomar uma dose, deve tomar a próxima dose normalmente, dentro do horário programado. Não dobrar a dose (duas doses ao mesmo tempo) para compensar uma dose esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# OLAPARIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Náusea, vômitos, cansaço/fraqueza, azia/indigestão (dispepsia), perda de apetite, dor de cabeça, alteração no sabor da comida (disgeusia), tontura, diarreia (se a reação se agravar, informe o seu médico imediatamente), tosse, falta de ar (dispneia). Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

**81 2103-5000 - Ramal: 2357**

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

**9h às 15h**

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## PALBOCICLIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento do câncer de mama avançado ou metastático HR (receptor hormonal) positivo e HER2 (receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano) negativo, em combinação com terapia endócrina.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, uma vez ao dia, durante 21 dias consecutivos, seguido por sete dias sem tratamento para compor um ciclo completo de 28 dias. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Pode causar inflamação grave dos pulmões que pode levar à morte. Informe imediatamente o seu médico se tiver sintomas novos ou agravantes, incluindo: problemas pulmonares, tais como diminuição da taxa de oxigênio, tosse e dificuldade para respirar ou falta de ar.

**Unimed**   
Caruaru

# PALBOCICLIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso o paciente apresente vômito ou deixe de tomar uma dose do medicamento, uma dose adicional não deve ser tomada. A dose seguinte prescrita deve ser tomada no horário habitual.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Infecções, diminuição de células do sangue, diminuição do apetite, estomatite (inflamação da mucosa da boca), náusea, diarreia, vômito, erupção cutânea, perda de cabelo, fadiga, fraqueza, febre. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## PONATINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de leucemia mieloide crônica (LMC) de fase crônica (LMC-FC), de fase acelerada (LMC – FA) ou de fase blástica (LMC – FB); Leucemia linfoblástica aguda de cromossomo Filadélfia positivo (LLA Ph+).

### **Como você deve usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Pode ser tomado com ou sem alimentos. Não esmagar nem dissolver os comprimidos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Antes de iniciar o tratamento com ponatinibe, a condição cardiovascular do paciente deve ser avaliada, incluindo histórico clínico e exame físico, e os fatores de risco cardiovascular devem ser ativamente monitorados.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Caso tenha esquecido de tomar a dose anterior, tome a dose seguinte normalmente. Não dobre a dose.

**Unimed**   
Caruaru

# PONATINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

As reações adversas mais frequentes podem incluir infecções e infestações do trato respiratório superior; Doenças do sangue (anemia, diminuição da contagem de plaquetas, diminuição da contagem de neutrófilos); Diminuição do apetite; Insônia; Dores de cabeça e tonturas; Hipertensão; Doenças gastrointestinais (dor abdominal, diarreia, vômito, constipação, náuseas, lipase aumentada); Doenças de pele (erupção cutânea, pele seca) Doenças musculoesqueléticas (dor óssea, artralgia, mialgia, dores nas extremidades, dor nas costas, espasmos musculares); Distúrbios gerais (fadiga, astenia, edema periférico, estado febril, dor).

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original, protegido da umidade. O medicamento deve ser usado em até 30 dias após aberto.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor, devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## REGORAFENIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento de pacientes adultos com:

- tumores estromais gastrintestinais (GIST) metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe.
- carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com sorafenibe.
- câncer colorretal (CCR) metastático que tenham sido previamente tratados com, ou não sejam considerados candidatos para, as terapias disponíveis. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

A dose recomendada é de 160mg de regorafenibe (4 comprimidos revestidos contendo 40mg de Regorafenibe cada) ingeridos via oral uma vez ao dia durante 3 semanas de terapia seguido de 1 semana sem terapia para compreender um ciclo de 4 semanas.

**Unimed**   
Caruaru

# REGORAFENIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se uma dose for esquecida, a mesma deve ser ingerida no mesmo dia, assim que o paciente se lembrar. O paciente não deve ingerir duas doses no mesmo dia para compensar uma dose esquecida. No caso de vômito após a administração, o paciente não deve ingerir comprimidos adicionais.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Infecção, anemia, diminuição do apetite, hipertensão, diarreia, estomatite, náuseas, vômitos, erupção cutânea, fadiga, perda de peso.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter os comprimidos na embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## RIBOCICLIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento em pacientes que possuem um tipo de câncer de mama chamado de câncer de mama receptor hormonal positivo (RH+), e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 negativo (HER2-) que esteja localmente avançado ou tenha se espalhado para outras partes do corpo (metastático).

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, uma vez ao dia, durante 21 dias consecutivos, seguido por sete dias sem tratamento para compor um ciclo completo de 28 dias. Deve ser tomado todos os dias no mesmo horário, de preferência pela manhã, com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Você deve fazer exames de sangue regularmente antes e durante o tratamento para monitorar a função do fígado e a quantidade de células sanguíneas (glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas) e eletrólitos (saís de sangue, incluindo potássio, cálcio, magnésio e fosfato) em seu corpo. A atividade elétrica do coração também será monitorada antes e durante o tratamento com um exame chamado eletrocardiograma (ECG).

**Unimed**   
Caruaru

# RIBOCICLIBE

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se você vomitar após tomar a dose ou esquecer uma dose, pule a dose perdida naquele dia. Tome a dose seguinte no horário habitual. Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida/perdida.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Febre, sudorese ou calafrios, tosse, sintomas de gripe, perda de peso, falta de ar, catarro com sangue, feridas em seu corpo, áreas quentes ou doloridas por seu corpo, diarreia ou dor de estômago, sensação de cansaço (sinais ou sintomas de infecções). Dor de garganta ou úlceras na boca. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico

## Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## SULFASSALAZINA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Gastroenterologia: tratamento da retocolite ulcerativa inespecífica, tratamento da colite ulcerativa de gravidade moderada, terapia adjuvante na colite ulcerativa grave e na doença de Crohn. Reumatologia: tratamento da artrite reumatoide e espondilite anquilosante.

### **Como devo usar este medicamento?**

Deve ser administrado em doses divididas igualmente a cada período de 24 horas, por via oral, ingerir inteiro com água. Sempre que possível, os comprimidos devem ser administrados após as refeições. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Deve ser administrado com cautela em pacientes com alergia ou asma. A administração adequada de líquidos deve ser mantida de modo a prevenir a cristalúria e a formação de cálculos. Hemograma completo e análise de urina com exame microscópico devem ser realizados com frequência. Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

**Unimed**   
Caruaru

# SULFASSALAZINA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Se deixar de tomar uma dose, não tome uma dose adicional. Apenas retorne ao tratamento habitual.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Dor de cabeça, erupções cutâneas, urticária, náusea, vômito, dispepsia, anorexia, oligospermia reversível, tontura, dor abdominal, estomatite, febre, leucopenia, trombocitopenia, alterações em exames de função hepática.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em sua embalagem original, protegido da luz e umidade.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## SUNITINIBE

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de tumor estromal gastrointestinal; carcinoma metastático de células renais; tumores neuroendócrinos pancreáticos; E tratamento adjuvante de pacientes adultos com alto risco de carcinoma de células renais (CCR) recorrente após remoção cirúrgica conhecida como nefrectomia.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, podendo ser administrado com ou sem a ingestão de alimentos, de preferência no mesmo horário todos os dias. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Caso você esqueça de tomar o medicamento no horário estabelecido pelo seu médico, não tome uma dose adicional. Neste caso, tome a dose recomendada no dia seguinte, como faria habitualmente. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

**Unimed**   
Caruaru

# SUNITINIBE

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Infecções, diminuição de células sanguíneas, anemia, hipotireoidismo, diminuição do apetite, insônia, dor de cabeça, alteração do paladar, hipertensão, dispneia (falta de ar), sangramento nasal, dor abdominal, diarreia, vômito, náusea (enjoo), má digestão, estomatite (inflamação da mucosa oral), constipação, erupção cutânea, inflamação com alteração da sensibilidade da palma das mãos e planta dos pés), alteração na cor da pele e do cabelo, pele seca, dor nas extremidades (mãos e pés), dor nas articulações, fadiga, inflamação das mucosas, edema (inchaço), febre.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), protegido da umidade. Manter em embalagem original

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico

## Unimed Caruaru

Acompanhe as informações sobre sua medicação.

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## TAMOXIFENO

### Para que este medicamento é indicado?

Tratamento de câncer de mama, em homens e mulheres.

### Como devo usar este medicamento?

Por via oral, ingerir inteiro com água. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

### O que devo saber antes de usar este medicamento?

Contém lactose. Pode aumentar o risco de complicações microvasculares de enxerto em cirurgias tardias de reconstrução de mama.

### O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Caso esqueça-se de tomar o comprimido, a medicação só deve ser tomada se faltar mais de 12 horas para a próxima dose. Caso o intervalo seja menor que 12 horas, pular a dose perdida e continuar a terapia no horário habitual. Não tome uma dose adicional para compensar a esquecida.

**Unimed**   
Caruaru

# TAMOXIFENO

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Náusea, retenção de líquido, sangramento e corrimento vaginal, erupções cutâneas, ondas de calor e fadiga.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz. Manter os comprimidos em embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## TEMOZOLOMIDA

### **Para que este medicamento é indicado?**

Tratamento de pacientes com: glioblastoma multiforme (tipo de tumor cerebral), recém-diagnosticado, em tratamento combinado com radioterapia, seguido de tratamento com temozolomida isoladamente (monoterapia); Tumores cerebrais como glioma maligno, glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, que apresentam recidiva ou progressão após tratamento padrão; melanoma maligno metastático.

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com um copo de água, sem abrir nem mastigar, com o estômago vazio, de preferência uma hora antes do café da manhã. Tomar uma vez ao dia.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Enjoos e vômitos são comumente associados ao tratamento com temozolomida, seu médico poderá receitar um medicamento para ajudar a combater os vômitos. Se você apresentar febre ou sintomas de alguma infecção, contate o seu médico imediatamente. Não abra as cápsulas. Se a cápsula for danificada, evite o contato do pó com sua pele, olhos ou nariz. Evite inalar o pó. Se seus olhos ou narinas forem atingidos acidentalmente pelo pó, lave a área com água.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você se esquecer de tomar as cápsulas no horário recomendado, tome-as assim que se lembrar. Se passou um dia inteiro, converse com o seu médico para receber orientação. Não tome a dose em dobro no mesmo dia, a menos que seu médico tenha recomendado essa conduta. Se você vomitar depois de ter tomado a sua dose do dia, não tome uma segunda dose no mesmo dia.

**Unimed**   
Caruaru

# TEMOZOLOMIDA

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Perda de apetite, dor de cabeça, constipação, enjoos, vômitos, vermelhidão na pele, queda de cabelos, cansaço, infecções na boca, alterações na contagem das células sanguíneas, perda de peso, ansiedade/depressão, sonolência, dificuldade de fala, alteração do equilíbrio, tontura, confusão, esquecimento, dificuldade de concentração, sensação de formigamento, manchas roxas na pele, tremores, visão borrada ou anormal, pernas inchadas, diarreia, dores abdominais ou de estômago, queimação, mal-estar gástrico, dificuldade para engolir, boca seca, irritação ou pele avermelhada, pele seca, coceira, fraqueza muscular, dores nas articulações, dores musculares. Caso as reações adversas se agravem, informe ao seu médico.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em embalagem original.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952

# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## VENETOCLAX

### **Para que este medicamento é indicado?**

É indicado para o tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em pacientes adultos e para o tratamento de pacientes recém-diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA).

### **Como devo usar este medicamento?**

Por via oral, ingerir inteiro com água, e durante as refeições, preferencialmente sempre no mesmo horário do dia. Este medicamento não deve ser mastigado, esmagado ou partido antes da ingestão.

### **O que devo saber antes de usar este medicamento?**

Para ajudar a evitar a Síndrome da Lise Tumoral (SLT), é muito importante manter-se hidratado e beber água todos os dias enquanto estiver em tratamento. Infecções graves podem ocorrer durante o tratamento, informe ao seu médico o quanto antes em caso de febre ou quaisquer sintomas de infecção.

### **O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?**

Se você esquecer de tomar uma dose de venetoclax no período de 8 horas do horário em que normalmente toma o medicamento, deverá tomá-la o quanto antes, retomando o tratamento. Se você se esquecer de tomar uma dose por mais de 8 horas do horário em que normalmente toma o medicamento, a dose esquecida NÃO deverá ser tomada, retomando o esquema de administração no dia seguinte. Se você vomitar após a tomada da dose, não tomar uma dose adicional.

**Unimed**   
Caruaru

# VENETOCLAX

## **Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?**

Alterações no sistema sanguíneo e linfático: neutropenia, anemia, linfopenia. Alterações gastrointestinais: diarreia, vômito, náusea, constipação. Outras alterações: fadiga, infecção do trato respiratório superior, pneumonia, infecção do trato urinário, sepse.

## **Onde e como posso guardar este medicamento?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Manter em sua embalagem original, protegido da luz e umidade.

## **Como descartar os quimioterápicos orais?**

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### **INFORMAÇÕES:**

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### **HORÁRIO DE ATENDIMENTO:**

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

Responsável Técnico: Dr. Pedro José de Oliveira Melo CRM: 8722 PE

ANS - nº 340952



# Atendimento Oncológico Unimed Caruaru

*Acompanhe as informações  
sobre sua medicação.*

Data de criação: 05/01/2024

Data de revisão: 05/05/2025

## VINORELBINA

### Para que este medicamento é indicado?

Indicado para o tratamento de câncer de pulmão de não pequenas células e câncer de mama metastático.

### Como você deve usar este medicamento?

Por via oral, ingerir inteiro com água. Recomenda-se que a administração seja feita logo após a ingestão de algum alimento. As cápsulas não devem ser abertas, esmagadas ou mastigadas. **O conteúdo líquido dentro da cápsula é irritante.** A exposição acidental do conteúdo da cápsula à pele, mucosa ou olhos deve ser lavada imediatamente com água ou solução salina normal;

### O que devo saber antes de usar este medicamento?

O conteúdo líquido é irritante, se você mastigar ou chupar acidentalmente a cápsula, deve lavar a boca com água ou de preferência com soro fisiológico. Se a cápsula estiver cortada ou danificada, o contato de seu conteúdo, que tem propriedades irritantes, pode ser nocivo se houver contato com a pele, membranas mucosas ou olhos. As cápsulas danificadas não devem ser engolidas e devem ser devolvidas ao farmacêutico ou ao médico para que possam ser descartadas adequadamente. Na eventualidade de contato, lavar imediatamente com água ou de preferência, com soro fisiológico.

### O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Nunca aumente o número de cápsulas a tomar para compensar o esquecimento. Procure aconselhar-se junto do seu médico ou farmacêutico.

**Unimed**   
Caruaru

# VINORELBINA

## O que devo fazer quando esquecer de usar este medicamento?

Nunca aumente o número de cápsulas a tomar para compensar o esquecimento. Procure aconselhar-se junto do seu médico ou farmacêutico.

## Quais as reações adversas e efeitos colaterais este medicamento pode ocasionar?

Neuropatia periférica, perda dos reflexos profundos. Infecções, febre. Fraqueza. Alopecia. Náuseas, constipação, vômitos, diarreia e anorexia. Aumento sérico de transaminases e bilirrubina. Leucopenia, neutropenia e anemia. Aumento da creatinina sérica.

## Onde e como posso guardar este medicamento?

Conservar refrigerado (2° a 8° C). Não congelar.

## Como descartar os quimioterápicos orais?

Em caso de tratamento suspenso, por orientação médica, e possuir sobra de medicamentos, favor devolver para o Centro de Oncologia Unimed Caruaru ou a unidade de saúde mais próxima de você para o descarte adequado. Sempre em casos de dúvidas, consulte o farmacêutico responsável pela sua medicação.

### INFORMAÇÕES:

81 2103-5000 - Ramal: 2357

### HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

9h às 15h

**Unimed**   
Caruaru

ANS - nº 340952