



ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS

EXEMESTANO

Unimed 
Barra Mansa

50
ANOS

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Tomar um comprimido uma vez ao dia preferencialmente após uma refeição.

ALGUMAS REAÇÕES PODEM APARECER COMO:

Rubor (Vermelhidão), artralgia (dor nas articulações), fadiga (cansaço), enjoos, cefaleia (dor de cabeça), tontura, dentre outras.

CUIDADOS IMPORTANTES:

Guarde seus medicamentos em local fresco, arejado afastado da luz do sol, do calor e de locais com umidade.

Exemestano pode reduzir a densidade mineral óssea e aumentar o risco de fraturas, portanto o monitoramento com médico deve ser realizado rotineiramente.

O QUE DEVO FAZER QUANDO SE ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO:

Caso você esqueça de tomar Exemestano no horário estabelecido, deve tomá-lo assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e tomar a próxima. Neste caso, você não deve tomar a dose duplicada para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Medicamentos que podem diminuir o efeito do Exemestano: Fenitoína, Rifampicina, Carbamazepina, fenobarbital e Erva de São João.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO POR CONTA PRÓPRIA!

Unimed 
Barra Mansa

50
ANOS



ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS

TAMOXIFENO

Unimed 
Barra Mansa

50
ANOS

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Ingerir sempre com água e de preferência no mesmo horário todos os dias. O comprimido não pode ser partido ou mastigado.

Pode ser ingerido em jejum ou após a alimentação.

ALGUMAS REAÇÕES PODEM APARECER COMO:

Náusea, retenção de líquidos (possivelmente vista como tornozelos inchados), sangramento vaginal, corrimento vaginal, erupções na pele, coceira ou descamação da pele, ondas de calor e cansaço.

Outras reações são menos comuns: elevação dos níveis de triglicérides, câibras, dores musculares, esteatose (gordura no fígado), dor de cabeça, sensação de dormência/formigamento.

CUIDADOS IMPORTANTES:

Guarde seus medicamentos em local fresco, arejado afastado da luz do sol, do calor e de locais com umidade.

Este medicamento contém lactose, portanto, deve ser usado com cautela em pacientes com intolerância a lactose. Avise o médico ou o farmacêutico caso tenha intolerância à Lactose.

O QUE DEVO FAZER QUANDO ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO:

Você só pode tomar o comprimido se faltar mais de 12 horas para a próxima tomada. Exemplo: o paciente toma a medicação todos os dias às 20:00 e esqueceu de tomar. Ele só pode tomar o medicamento esquecido se for antes das 08:00 da manhã do dia seguinte. Se for 08:00 não tomar e aguardar o próximo horário de tomada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Tamoxifeno deve ser utilizado com cuidado em pacientes que estejam tomando anticoagulantes (ex. varfarina), quimioterápicos, rifampicina e antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ex. paroxetina).

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO POR CONTA PRÓPRIA!

Unimed 
Barra Mansa

50
ANOS

Orientações de Uso de Medicamentos

O que é o LETROZOL?

O LETROZOL bloqueia a produção de estrogênios, reduzindo a presença destes hormônios no sangue. Nos casos de câncer de mama com receptores positivos para hormônios femininos, os estrogênios estimulam o crescimento do tumor. Desta forma, reduzir os estrogênios no sangue é uma forma importante de tratamento.



Quais os nomes comerciais e formas de aplicação do LETROZOL?

O LETROZOL pode ser encontrado como medicamento genérico ou sob o nome comercial de FEMARA. O medicamento está disponível na forma de comprimidos de 2,5 mg e deve ser tomado por via oral.

Quais as indicações do LETROZOL?



O LETROZOL é indicado para tratamento de câncer de mama com receptores hormonais positivos em mulheres na pós-menopausa. O LETROZOL pode ser utilizado em três contextos:

- No tratamento preventivo após a cirurgia da mama (adjuvância) para evitar recidivas.
- Antes da cirurgia da mama (neoadjuvância) com o intuito de reduzir a lesão antes da cirurgia, possibilitando muitas vezes uma cirurgia menor.
- Pode, ainda, ser utilizado para o controle de doença avançada, quando já há metástases, ou seja, lesões em outros órgãos além da mama.

Quais são os principais efeitos colaterais do LETROZOL? Quais cuidados tomar durante o uso?

Os efeitos colaterais mais comuns do LETROZOL são fogachos (ondas de calor), dores articulares, náuseas, fadiga e secura vaginal. Esses efeitos colaterais podem influenciar na qualidade de vida. Sempre que sentir algum desses sintomas, avise seu médico. É importante monitorar a densidade dos ossos durante o tratamento com LETROZOL, pois existe o risco de osteoporose em pacientes predispostas. Pode haver algumas alterações nos exames laboratoriais durante o uso de LETROZOL, como aumento da glicose, colesterol e triglicérides. É contraindicado o uso de LETROZOL na pré-menopausa, durante a gravidez e durante a amamentação.

Orientações de Uso de Medicamentos

Interações medicamentosas

Você sabia que alguns medicamentos podem interferir na ação do LETROZOL? Pode ocorrer tanto a diminuição das concentrações séricas (concentrações no sangue) quanto o aumento. Por isso, não faça a auto medicação, procure sempre seu médico ou um farmacêutico para lhe orientar.

Exemplos de fármacos que podem aumentar as concentrações séricas de letrozol: cetoconazol, itraconazol, voriconazol, ritonavir, claritromicina e telitromicina; metoxisaleno.

Exemplos de fármacos que podem diminuir as concentrações séricas de letrozol: ofenitoína, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital e Erva de São João.

Como você deve tomar esse medicamento?

- Tomar medicamento conforme prescrição médica, com um copo d'água todos os dias e de preferência no mesmo horário.

Importante: esse medicamento não deve ser partido ou mastigado

- Respeite sempre o mesmo horário, a dose e a duração do tratamento.

O que você deve fazer se esquecer de tomar o medicamento?

- Se você esqueceu de tomar o comprimido de Letrozol, tome a próxima dose no horário habitual.

- Não tome duas doses ao mesmo tempo.

Como guardar esse medicamento?

- Proteger da luz e manter a uma temperatura de 15 a 30 °C, e sempre manter os medicamentos longe do alcance das crianças e de animais.

- Não guardar na cozinha ou no banheiro, pois são lugares muito úmidos e quentes.

ANASTROZOL



O que é o Anastrozol?

O Anastrozol é um medicamento para tratamento de câncer de mama, seja em estágio inicial ou no estágio mais avançado, em mulheres que já passaram pela menopausa, ajudando até a diminuir as chances de ter novamente a doença.

Ele atua no processo que impede que a testosterona em se transforme em estrogênio, sendo mais específico, no estradiol, que é o hormônio sexual feminino. A eficiência do Anastrozol é justamente porque ele impede o processo de aromatase, responsável por contribuir com a formação e desenvolvimento do câncer de mama.

Por ser um inibidor, funciona como uma terapia hormonal e pode ser usada tanto em homens quanto em mulheres. Com atuações e propósitos diferentes, o remédio atua diretamente na interrupção da aromatase.



Como devo tomar esse medicamento?

- Tomar medicamento conforme prescrição médica, com um copo d'água todos os dias e de preferência no mesmo horário.

- Respeite sempre o mesmo horário, a dose e a duração do tratamento.

Importante: esse medicamento não deve ser partido ou mastigado



O que devo fazer se esquecer de tomar um comprimido?

- Se passaram até 12 horas do horário previsto: tome o medicamento normalmente
- Mais de 12 horas: pule a dose perdida e tome normalmente no próximo horário previsto.

× Nunca tome a dose duplicada (dois comprimidos de uma só vez).

× Não faça ajuste de dose ou interrompa o uso sem autorização médica.

Orientações de Uso de Medicamentos



Como guardar meu medicamento?

- Proteger da luz e manter a uma temperatura de 15 a 30 °C, e sempre manter os medicamentos longe do alcance das crianças e de animais.

✗ Não guardar na cozinha ou no banheiro, pois são lugares muito úmidos e quentes.



Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.



Eu posso tomar outros medicamentos durante o tratamento?

Todo medicamento deve ser prescrito por um médico. Se possível, pelo médico que está fazendo seu acompanhamento. Caso, tenha alguma dúvida, entre em contato com nossas Farmacêuticas.



O ANASTROZOL tem interação com alimentos?

Não é relatada interação com alimentos.

Orientações de Uso de Medicamentos



Principais reações adversas:

Assim como outros medicamentos, o Anastrozol também é capaz de causar efeitos colaterais. Apesar disso, de todos os remédios que possuem a mesma função dele, ele é o que menos apresenta reações no corpo das mulheres. Mas, entre os principais efeitos, estão:

- Sonolência – por isso, quem opera máquinas ou dirige com frequência deve ter cuidado;
- Enjoo;
- Diarreia;
- Fogachos (Ondas de calor);
- Astemia (Fraqueza);
- Artrite;
- Erupção cutânea (manchas vermelhas e cosseira);
- Cefaleia (Dores de cabeça);
- Artralgias (dores nas articulações);
- Enfraquecimento ou queda de cabelos.

Se aparecerem outras reações, consulte o médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Atenção! Podem ocorrer mudanças como alopecia (queda de cabelo); secura e sangramento vaginal; perda do apetite, perda e alteração paladar; sensação de formigamento ou dormência da pele.¹ Informe seu médico ou profissional da saúde:

!! Se apresentar febre maior que 38°C, calafrios, falta de ar, dispneia após esforço, significativo ganho de peso, edema periférico, náusea, vômito ou diarreia por mais de 24 horas.

Referência: 1 – Bula do medicamento Anastrozol.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. O uso de anastrozol é contraindicado durante lactação. Este medicamento pode causar doping.