

Diferenças entre as vacinas na rede pública e rede particular:

3º Mês

Meningocócica C, Meningocócica ACWY e Meningocócica B

Rede pública: A vacina Meningocócica C (conjugada), na rede pública, é aplicada em três doses: a primeira no terceiro mês, a segunda no quinto e um reforço entre os 12 a 15 meses. A vacina é utilizada para prevenir as doenças provocadas pela bactéria *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C. Essa bactéria pode causar infecções graves, como a meningite e a sepse.

Rede Particular: A vacina Meningocócica C (conjugada), oferecida na rede particular é igual à da rede pública. Contudo, na rede particular, são oferecidos outros dois tipos de vacina a Meningocócica ACWY e a Meningocócica B.

A vacina Meningocócica ACWY é aplicada em três doses, sendo a primeira no terceiro mês, a segunda no quinto mês e o reforço deve ser aplicado com 12 a 15 meses. Essa vacina protege contra as meningites e infecções generalizadas, causadas pela bactéria *Meningococo* dos tipos A,C,W e Y. Substitui a vacina Meningocócica C pela Meningocócica ACWY.

A vacina Meningocócica B é aplicada em três doses, sendo a primeira no terceiro mês, a segunda no quinto mês e o reforço deve ser aplicado com 12 a 15 meses. Essa vacina protege contra quatro tipos da meningite do grupo B, incluindo um dos tipos mais fatais de Meningite.