



SAÚDE BUCAL

Gestantes

Revisão Técnica

Dr. Marlus Volney de Morais | CRM 6111 • Dra. Ana Paula Torga | CRM 25.273
• Dr. Marcelo Garcia Kolling | CRM 20.912 • Dr. Rodrigo Cechelero Bagatelli
| CRM 19.593 | Dr. Francisco Carlos Becker • CRM 31.550 • Daniel Correa Trevelim
| CRO 20865/PR



- Capriche na escovação dos dentes, pois, com o aumento do consumo alimentar, o risco de aparecer cárie é maior.
- As gengivas ficam mais sensíveis e mais irritadas com a presença de placas bacterianas.
- **Importante:** os dentes de leite do bebê começam a se formar a partir da trigésima semana de gestação, já os dentes permanentes, a partir do sexto mês de vida, com isso, atente-se ao uso de medicamentos, à infecções e deficiências nutricionais.
- **Períodos da gestação:**
 - o 1.º trimestre da gravidez é o menos adequado para tratamentos odontológicos, pois é o período que ocorrem as principais transformações do embrião. Nesse período, evite, principalmente, realizar radiografias;
 - o 2.º trimestre é o mais adequado para procedimentos odontológicos essenciais;
 - o 3.º trimestre é quando há maior risco de síncope, hipertensão e anemia, além do desconforto da cadeira, podendo levar a hipotensão postural.
- É prudente evitar tratamento odontológico nesse período, porém não é proibido.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

