


29,7 cm

HIDRATAÇÃO

Este tratamento pode causar uma redução rápida do tumor podendo apresentar o quadro de Síndrome da Lise Tumoral (SLT), por isso a hidratação constante é muito importante para reduzir este risco. Recomenda-se o consumo de 06 a 08 copos de água (1,5 a 2L) durante as primeiras 04 semanas de tratamento.

COMO BEBER 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA

	1 Copo antes do café da manhã
	2 Copos no meio da manhã
	1 Copo antes do almoço
	2 Copos na parte da tarde
	1 Copo antes do jantar
	1 Copo antes de dormir

COPO DE 250ml

GUIA CALENDÁRIO PARA O TRATAMENTO DE LMA

1 comprimido 100mg ☐ 1º Dia Hora: _____	2 comprimidos 100mg ☐ 2º Dia Hora: _____	4 comprimidos 100mg ☐ 3º Dia Hora: _____
---	--	--

4 comprimidos 100mg ☐ A partir do 4º dia conforme prescrição médica Hora: _____	6 comprimidos 100mg ☐ A partir do 4º dia conforme prescrição médica Hora: _____
---	---

PARA RECORDAR:

OS COMPRIMIDOS SEMPRE DEVEM SER INGERIDOS POR INTEIRO, COM ÁGUA, DURANTE AS REFEIÇÕES E DE PREFERÊNCIA SEMPRE NO MESMO HORÁRIO.

SE TIVER MAIS QUE UM COMPRIMIDO DO TRATAMENTO NO DIA, ELE DEVE SER INGERIDO UM SEGUINTE DO OUTRO.

Quimioterapia Unimed Regional Jaú

Av. Antonio Prado Lyra - 564
Jardim Alvorada, Jaú/ SP
T. (14) 2104-8930/ Ramal 6016
E-mail: quimioterapia@unimedjau.com.br

REFERÊNCIAS

ABBVIE FARMACÊUTICA - VENCLEXTA BULA 26 VP:
WWW.ABBVIE.COM.BR/CONTENT/DAM/ABBVIE-CO
M2/BR/DOCUMENTS/BU22-VENCLEXTA-VP.PDF

Rev. 00/2026



ANS nº 30.676-2

INFORMATIVO DO PACIENTE EM USO DE **VENCLEXTA®** (VENETOCLAX) VIA ORAL

DESTINADO PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO DE
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

QUIMIOTERAPIA

Unimed 
Regional Jaú

21 cm

SOBRE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é um câncer das células precursoras mieloides do sangue (blastos mieloides). As alterações nestas células impedem que os blastos mieloides se tornem células sanguíneas maduras, resultando em um acúmulo de blastos imaturos na medula e no sangue e gerando poucos glóbulos vermelhos, plaquetas e granulócitos (tipo de glóbulo branco). É mais comum ocorrer em adultos do que crianças, sendo mais prevalente no sexo masculino.

O diagnóstico da doença é fornecido através de um exame de sangue e confirmado a partir da análise da medula óssea. Por isso mantenha a visita ao seu médico e exames sempre em dia.

TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA COM VENETOCLAX?

• LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA):

VENCLEXTA® (venetoclax), seu médico pode optar por combinação com outros medicamentos, para pacientes diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA).

Pertencente a um grupo de medicamentos chamados inibidores da proteína BCL2, o VENCLEXTA® (venetoclax) funciona bloqueando a proteína antiapoptótica no corpo. Esta proteína que ajuda as células cancerosas a sobreviverem. O bloqueio desta proteína ajuda a matar e reduzir o número de células cancerosas. Ele também pode retardar o agravamento (piora) da doença.

• COMO USAR O VENCLEXTA®:

VIA DE INGESTÃO	HORÁRIO	INGESTÃO
 VIA ORAL	 Sempre no mesmo horário	 Sempre com água e durante as refeições

Observação: os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, não mastigar, esmagar ou partir, antes da ingestão

COMO GUARDAR O SEU MEDICAMENTO

VENCLEXTA® (venetoclax), tem um tratamento mensal com embalagem contendo 120 comprimidos revestidos com 100 mg de Venetoclax.

Os comprimidos devem ser mantidos sempre em sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Pacientes com Leucemia normalmente fazem uso de muitos medicamentos durante o tratamento, sendo assim nunca deve se fazer a automedicação, portanto quaisquer sintomas que esteja sentido e qualquer inclusão ou troca de medicamento ou suas dosagens, devem ser informados ao seu médico para um possível ajuste do tratamento.

Além disso deve se evitar os produtos a base de toranja (grapefruit), pomelo, laranja-azedada (inclusive a geleia) e carambola durante o tratamento com VENCLEXTA® (venetoclax).

REAÇÕES ADVERSAS E POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS:

Qualquer tratamento possui reações adversas e efeitos colaterais, por isso alguns deles já são esperados. Apesar disso, é sempre importante manter o médico responsável ciente de toda e qualquer queixa que esteja apresentando. Porém, algumas reações comuns em pacientes podem ser observadas no dia a dia, como:

Diarreia, vômito, náusea, constipação (prisão de ventre), fadiga e infecção do trato urinário.

E outras devem ser investigadas e analisadas pelos médicos, como: hemograma e outros exames laboratoriais.

COMO INICIAR O TRATAMENTO PARA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA COM VENETOCLAX?

A dose de VENCLEXTA® (venetoclax) para o tratamento de pacientes com Leucemia Mieloide Aguda depende das medicações utilizadas. O início do tratamento ocorre com paciente sob supervisão de uma equipe multiprofissional, de médicos, enfermeiros e farmacêuticos.

No entanto o esquema posológico de VENCLEXTA® (venetoclax) (incluindo o escalonamento de dose) é apresentado na tabela a seguir:

DIA	DOSE DIÁRIA	
01	100 mg	
02	200 mg	
03	400 mg	
A partir do 4º dia	400 mg Quando em combinação com um agente hipometilante	600 mg Quando em combinação com citarabina em baixa dose

***Relembrando que todos os comprimidos sempre devem ser ingeridos por inteiro, com água, durante as refeições e de preferência sempre no mesmo horário.**

****As doses podem variar de acordo com a prescrição médica.**

ESQUECIMENTO DA DOSE

Se o paciente esquecer de tomar uma dose de venetoclax no período de 8 horas do horário em que normalmente toma, deverá tomá-la assim que possível, retomando o tratamento normalmente. Muito importante se lembrar de nunca duplicar a dose do medicamento, continue sempre de acordo com o escalonamento de dose e o horário habitual.

Se passar mais que 48 horas sem tomar o medicamento, informe seu médico ou farmacêutico responsável.