



GUIA DE ORIENTAÇÕES DA HEMODINÂMICA



HOSPITAL

Unimed 

Regional Jaú



O QUE É O SERVIÇO DE HEMODINÂMICA?

Trata-se de um setor especializado e equipado com aparato radiológico e tecnológico sofisticado, para a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos por meio da introdução de cateteres (tubos plásticos e longos) em uma pequena incisão na pele.

Os cateteres têm como rota o interior dos vasos sanguíneos (artérias e veias) das diversas regiões do corpo. Neles são feitas injeções de contraste, que permitem a visualização e registro das imagens em diversas posições, quando o sistema de Imagem é acionado.

Através destes procedimentos, é possível diagnosticar e, quando indicado, tratar de lesões obstrutivas das artérias do coração, cérebro, pescoço, rins e dos membros superiores e inferiores, além de doenças como aneurisma cerebral, cardiopatias congênitas, arritmias cardíacas graves, entre outras.

TIPOS DE PROCEDIMENTOS QUE SÃO REALIZADOS

Procedimentos Diagnósticos

Cateterismo Cardíaco, arteriografias (cerebral, renal, hepática, membros superiores e inferiores), estudo eletrofisiológicos, dentre outros.

Procedimentos de tratamento

Angioplastia com implante de Stent, embolização de aneurisma, ablação por cateter, tratamento cardíacos congênitos, entre outros.



PREPARO PARA EXAMES

1. JEJUM

- ◆ Recomenda-se jejum de 6h para procedimentos de cateterismo e angiografia eletivos
- ◆ 8h para procedimentos estruturais (TAVI; CIA/FOP; outros)
- ◆ Emergências sem jejum

2. MEDICAMENTOS

- ◆ Informar no agendamento todas as medicações que faz uso.
- ◆ Algumas devem ser suspensas por 2 dias antes do procedimento, como: Metformina, Glucoformim, Glifage e retornar o uso no dia seguinte ao exame
- ◆ Insulinas - suspender no dia do exame e reiniciar após procedimento.
- ◆ Anticoagulantes: 2 dias sem uso de: Pradaxa; Eliquis (Apixabana); Lixiana (Edoxabana); Xarelto (Rivaroxabana);
- ◆ A critério do médico realizar com apenas 24h de suspensão desses;
- ◆ Marevan e cumadimicos suspensão de 5 dias antes (recomendável solicitação de 1 dia antes tap (inr) e possível transição com enoxaparina para paciente que fazem uso desses medicamentos por próteses mecânicas)
- ◆ Estimulantes sexuais como Viagra (Sildenafil) ou qualquer medicamento derivado, devem ser suspensos 2 dias antes do procedimento.
- ◆ O paciente que for realizar tratamento de angioplastia deve estar com regime de dupla antiagregação plaquetária (AAS e Clopidogrel ou outro agregante prescrito)



Sempre confirmar uso desses e seu tempo de terapia para o enfermeiro da hemodinâmica.

3. HISTÓRIA DE ALERGIA

Informe ao seu médico e no agendamento se você tem alergia a medicamentos, contraste iodado, iodo, esparadrapo, dentre outras.

Em alguns casos de alergia seu médico irá informar o tipo de preparo adequado.

4. PROBLEMAS RENAIS

Em caso de função renal alterada, recomenda-se realizar preparo medicamentoso antes do procedimento. Para avaliar a função renal o paciente deverá fazer exame de sangue (dosagem de creatinina).

Observação: se houver qualquer alteração no seu estado de saúde geral, entre em contato com seu médico ou com nosso serviço, informando sobre as alterações.

Alterações como: febre, diarreia, cansaço intenso e gripe devem ser comunicadas.

5. NO DIA DO PROCEDIMENTO

- ◆ Chegar 1h e 30 min antes do procedimento
- ◆ É obrigatória a presença de 1 acompanhante
- ◆ É necessário levar todos seus exames recentes e a receita dos medicamentos em uso
- ◆ Não se esqueça dos documentos pessoais, além de carteira do convênio, guia do procedimento autorizada e pedido médico



COMO O PROCEDIMENTO É REALIZADO?

Ao chegar no setor de Hemodinâmica, você será encaminhado para a sala de preparo onde haverá confirmação de seus dados e do procedimento.

Será necessário vestir a roupa apropriada do hospital e retirar todos os pertences, que deverão ser entregues ao acompanhante responsável.

Haverá a tricotomia (retirada de pelos) do punho e/ou na região da virilha, além de punção venosa no braço para administração de Soro Fisiológico e medicamentos, se necessário.

Após o preparo o paciente é encaminhado para a sala de procedimentos, com monitorização contínua (batimentos cardíacos, ritmo cardíaco, pressão arterial e saturação de oxigênio). O local do exame (punho ou virilha), receberá uma solução antisséptica e campos estéreis. O médico então iniciará o procedimento aplicando anestesia local.

Durante o procedimento você poderá sentir algumas sensações desconfortáveis, tais como: calor, queimação no corpo e náusea. Você deve informar ao médico tudo que estiver incomodando.

Durante o procedimento, o médico poderá fazer algumas solicitações, como por exemplo: respirar fundo, tossir forte, prender a respiração e pedir para não se mexer. Neste momento a sua cooperação é de extrema importância. O tempo de duração dependerá do procedimento que será realizado.

No caso de procedimento de Angioplastia, ao término do procedimento o paciente será encaminhado para a enfermaria ou se necessário encaminhado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para observação contínua nas primeiras horas após o procedimento, e sua alta da UTI será realizada pelo seu médico junto ao médico responsável pela UTI, conforme estado clínico.

RETIRADA DE RESULTADOS

O número de protocolo para aquisição ao resultado do exame será entregue na alta do setor de hemodinâmica, com as orientações de acesso.

CUIDADOS VIA ACESSO RADIAL

- ◆ Após o procedimento se o acesso for pela via Radial (Punho direito) o paciente deverá ficar em repouso durante 3 horas, sem flexionar o braço/punho
- ◆ Retirar o curativo compressivo durante o banho no dia seguinte ao procedimento
- ◆ Não é necessário fazer outro curativo no local. Lave somente com água e sabão e mantenha o local seco
- ◆ Durante 3 dias, é recomendado evitar dirigir e carregar peso
- ◆ Consulte o médico em relação ao retorno ao trabalho e atividade física

CUIDADOS VIA ACESSO FEMORAL

- ◆ Após o procedimento se o acesso for pela via Femoral o paciente deverá ficar de repouso absoluto, de 5 horas após o procedimento, sem flexionar a perna ou elevar o tronco
- ◆ Retirar o curativo compressivo durante o banho no dia seguinte ao procedimento
- ◆ Não é necessário fazer outro curativo no local. Lave somente com água e sabão e mantenha o local seco
- ◆ Consulte seu médico em relação ao retorno ao trabalho e à atividade física
- ◆ Durante 3 dias, recomenda-se evitar carregar peso, subir e descer excessivamente escadas

CUIDADOS GERAIS

1. Ingerir bastante líquido nas primeiras 12 horas após o procedimento, exceto nos casos em que haja restrição na alimentação ou hidratação.
 2. Se apresentar manifestações do tipo: caroço, dor excessiva, inchaço, presença de secreção purulenta, sangramento no local onde o procedimento foi realizado ou febre, procure imediatamente o nosso serviço
- ◆ **Hemodinâmica:** atendimento de Segunda a Sexta-feira, de 7h30 às 17h telefone (14) 2104-8110
 - ◆ **Pronto Atendimento:** atendimento todos os dias 24h.

ANS - nº 30.676-2

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Regional Jaú

HOSPITAL UNIMED REGIONAL JAÚ

Av. Antônio de Almeida Pacheco, nº 1991
17213-700 - 2ª Zona Industrial - Jaú/SP
T. (14) 2104-8110